

**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección  
200mg · 300mg

DUPIXENT TE AYUDA  
**A SENTIR  
TU PIEL SANAR**  
Y VER LA DIFERENCIA

APROBADO POR LA FDA PARA NIÑOS DE 6 MESES EN ADELANTE



Paciente real. Los resultados individuales pueden variar.

**EL BIOLÓGICO MÁS RECETADO PARA EL ECZEMA  
MODERADO A GRAVE**

#### INDICACIONES

DUPIXENT es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado a grave, que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas que se aplican sobre la piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan usar terapias tópicas. DUPIXENT puede utilizarse con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños con DA menores de 6 meses.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

# ¿CUÁNDO ES MOMENTO DE REPENSAR TU TRATAMIENTO PARA EL ECZEMA?

El eczema puede ser un desafío, incluso cuando ya estás siguiendo los consejos de tu médico y usando cremas y ungüentos tópicos recetados (Rx) para controlarlo. Es posible que aún tengas que lidiar con erupciones cutáneas secas y con picazón, y con brotes continuos. Es una situación que enfrentan muchas personas con eczema moderado a grave, porque a veces los tratamientos tópicos recetados no son suficientes. Las erupciones con picazón siguen reapareciendo debido en parte a la inflamación debajo de la superficie de la piel. Esta inflamación es causada por un sistema inmunológico hiperactivo.

Tal vez sea hora de pedirle a tu médico un tratamiento que funcione de manera diferente.

## HABLA CON UN ESPECIALISTA EN ECZEMA CUANDO TÚ O TU HIJO:

- ▶ SIGUEN USANDO CREMAS Y UNGÜENTOS TÓPICOS RECETADOS QUE NO CONTROLAN SU ECZEMA
- ▶ EXPERIMENTAN PICAZÓN, MOLESTIA EN LA PIEL Y BROTES CON FRECUENCIA
- ▶ TOMAN ESTEROIDES ORALES O INMUNOSUPRESORES MÁS DE UNA VEZ AL AÑO
- ▶ OCULTAN SU PIEL DE LOS DEMÁS



ESCANEA AQUÍ PARA PREPARARTE PARA UNA CONVERSACIÓN CON TU MÉDICO



**KATE,  
PACIENTE REAL**

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

# LA INFLAMACIÓN EN EL INTERIOR PUEDE CAUSAR ECZEMA EN EL EXTERIOR

Es posible que estés tratando tu eczema moderado a grave solo con cremas y ungüentos tópicos recetados. ¿Pero es suficiente si las erupciones con picazón continúan reapareciendo?

Aunque el eczema aparece en la piel, los brotes y la picazón irritante se deben en parte a la inflamación debajo de la piel. **Por eso vale la pena explorar un tratamiento que actúe desde dentro, como DUPIXENT.**

Si tienes eczema, incluso el roce más simple puede resultar incómodo. Las interacciones cotidianas, desde los apretones de manos hasta los abrazos, pueden ser molestas para la piel irritada.

**DUPIXENT puede ayudarte a sentir tu piel sanar y ver la diferencia con menos picazón y una piel con menos lesiones.**



CAMERON,  
PACIENTE REAL

## DUPIXENT® (dupilumab) ACTÚA CONTINUAMENTE PARA:

- ▶ AYUDAR A BLOQUEAR UNA FUENTE CLAVE DE INFLAMACIÓN DENTRO DEL CUERPO QUE PUEDE CAUSAR ECZEMA
- ▶ AYUDARTE A GANARLE AL ECZEMA CON MENOS PICAZÓN Y UNA PIEL CON MENOS LESIONES
- ▶ TRATAR EL ECZEMA, INCLUSO ENTRE BROTES

## ¿SABÍAS QUE...? DUPIXENT:

- ▶ NO ES UN ESTEROIDE NI UN INMUNOSUPRESOR
- ▶ NO SE TOMA DIARIAMENTE
- ▶ SE PUEDE TOMAR CON O SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Antes de usar DUPIXENT, infórmale a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente: si tiene problemas oculares; si tiene una infección parasitaria (helmintos); si tiene programado recibir algún tipo de vacuna. No debe recibir ninguna "vacuna viva" antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.


# CONSIDERA UN ENFOQUE DIFERENTE

DUPIXENT es un medicamento biológico. Los medicamentos biológicos son medicamentos especializados que se utilizan para tratar una variedad de afecciones, incluidas enfermedades inflamatorias crónicas como el eczema moderado a grave.

Los medicamentos biológicos se procesan en el cuerpo de manera diferente a los medicamentos orales o tópicos. Para que sean eficaces y funcionen correctamente, la mayoría de los medicamentos biológicos son inyectables.

Si has tenido dificultades para controlar tu eczema solo con tópicos recetados, puede que sea momento de considerar un medicamento biológico como DUPIXENT. Ayuda a bloquear una fuente clave de inflamación debajo de la piel.

**DUPIXENT puede ayudarte a sentir tu piel sanar y ver la diferencia con menos picazón y una piel con menos lesiones.**



TYLER,  
PACIENTE REAL

MÁS DE **696,650\*** PACIENTES  
RECETADOS CON DUPIXENT

\*Pacientes adultos y pediátricos nuevos (6 meses o más) con eczema moderado a grave no controlado. Datos de la Fuente Nacional de Negocios (NSOB, por sus siglas en inglés) de IQVIA hasta junio de 2025.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente (continuación): si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT puede dañar al feto. Un registro de embarazo para mujeres que toman DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre su salud y la del bebé. Para inscribirse u obtener más información, llame al 1-877-311-8972 o ingrese en <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>; si está amamantando o tiene planes de amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.



RACHEL,  
PACIENTE REAL

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés y español](#)) y la Información para el paciente ([inglés y español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.



KENNY,  
PACIENTE REAL

## ¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO?

Antes de que un medicamento esté disponible para el público general, su eficacia y seguridad deben demostrarse mediante ensayos clínicos controlados.\* Después de completar estos ensayos, la información se envía a la FDA para su revisión. La FDA revisa los resultados del ensayo y toma una decisión sobre si aprueba o no el medicamento.

## ¿QUIÉNES FUERON INCLUIDOS EN LOS ENSAYOS?

DUPIXENT se estudió en 7 ensayos clínicos de eczema con 3032 pacientes, mayores de 6 meses.

Todos los grupos de edad tenían eczema moderado y/o grave que no estaba bien controlado.

## ¿QUÉ MIDIERON LOS ENSAYOS?

Los ensayos midieron la mejoría de la piel, la reducción de la picazón y la seguridad entre las personas que tomaban DUPIXENT en comparación con las que no lo tomaban. Cada ensayo midió los resultados a los 4 meses (16 semanas). Uno de los ensayos también midió los resultados al año (52 semanas).

## ¿QUÉ MEDICAMENTOS SE UTILIZARON?

Dependiendo del ensayo, los participantes recibieron uno de los siguientes:

- ▶ DUPIXENT
- ▶ Placebo (un tratamiento que parece real pero no contiene ningún medicamento)
- ▶ DUPIXENT con un corticosteroide tópico (CST)
- ▶ Placebo con CST

\*Los ensayos controlados tienen protocolos específicos que el médico y el paciente deben seguir. Existen otros tipos de ensayos clínicos, pero se requieren ensayos controlados para la aprobación de la FDA.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

# RESULTADOS DE SEGURIDAD DE 5 AÑOS EN ADULTOS



LOS RESULTADOS DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO EN ADULTOS EN UN ESTUDIO DE EXTENSIÓN FUERON CONSISTENTES CON LOS OBSERVADOS EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS ORIGINALES

Los efectos secundarios más comunes observados en los ensayos clínicos fueron: reacciones en el lugar de la inyección, problemas oculares, que incluyen inflamación de los ojos y los párpados, enrojecimiento, hinchazón, picazón, infección ocular, ojo seco y visión borrosa, herpes en la boca o en los labios y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES



APROBADO POR LA FDA PARA TRATAR A NIÑOS DE 6 MESES EN ADELANTE



ESTUDIADO EN 19 ENSAYOS CLÍNICOS: 7 ESPECÍFICAMENTE EN ECZEMA, 12 EN 5 OTRAS AFECIONES



NO SE REQUIEREN ANÁLISIS DE SANGRE INICIALES NI DE RUTINA, SEGÚN LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN



NO ES UN ESTEROIDE NI UN INMUNOSUPRESOR



EL BIOLÓGICO MÁS RECETADO PARA EL ECZEMA POR DERMATÓLOGOS Y ALERGISTAS

## ESCUCHA A PACIENTES REALES

DUPIXENT ha ayudado a muchos de nuestros embajadores a sentir su piel sanar y ver la diferencia. **Escanea para escuchar sus historias.**

Los resultados individuales pueden variar.



**ANTHONY,**  
PACIENTE REAL DESDE 2017

“Hoy finalmente siento que tengo cierto control sobre algo que estuvo fuera de control durante demasiado tiempo.”



**RACHEL,**  
PACIENTE REAL DESDE 2017

“Tomando Dupixent... Me preocupo menos por mi piel. El eczema no es lo primero en lo que pienso cuando salgo, y eso me hace sentir muy bien”.



ESCUCHA A MÁS PACIENTES EMBAJADORES

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

## DUPIXENT TE AYUDA A SENTIR TU PIEL SANAR Y VER LA DIFERENCIA

El eczema puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, etnia o género, y puede verse diferente en distintos tonos de piel. En algunos casos, las erupciones pueden verse rojas, grises, marrones o moradas.

En los ensayos clínicos en adultos, la eficacia de DUPIXENT ha sido generalmente consistente, independientemente de la raza/etnia.

### PACIENTES REALES DE DUPIXENT

Los resultados individuales pueden variar.

ANTES DEL TRATAMIENTO



DESPUÉS DE CUATRO MESES DE TRATAMIENTO

Paciente real de 4 años en un ensayo clínico.\*

ANTES DEL TRATAMIENTO



DESPUÉS DE CUATRO MESES DE TRATAMIENTO

Paciente adulto real en el mundo real. No es un paciente en un ensayo clínico.†

ANTES DEL TRATAMIENTO



DESPUÉS DE CUATRO MESES DE TRATAMIENTO

Paciente real de 10 años en un ensayo clínico.\*



ADULTOS



NIÑOS

ESCANEA PARA VER MÁS  
RESULTADOS EN LA GALERÍA  
DEL ANTES Y DESPUÉS

\*A todos los pacientes se les prescribieron corticosteroides tópicos (CST) de potencia baja o media según el programa de ensayo clínico.

†Dado que se trataba de un paciente del mundo real, otros factores pueden haber influido en los resultados del tratamiento (como el uso de otros tratamientos).

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Sobre todo, infórmele a su proveedor de atención médica si está tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados; o si tiene DA y asma y usa un medicamento para el asma.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa (inglés y español) y la Información para el paciente (inglés y español) disponibles en el bolsillo trasero.

# PIEL NOTABLEMENTE CON MENOS LESIONES Y ALIVIO DE LA PICAZÓN

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT FRENTE A PLACEBO

DOS ENSAYOS CLÍNICOS SEPARADOS DE 4 MESES CON ADULTOS DEMOSTRARON:

APROXIMADAMENTE  
4 VECES MÁS  
PACIENTES

LOGRARON UNA PIEL SIN  
LESIONES O CASI SIN LESIONES

37 % frente al 9 % que no tomaba DUPIXENT (placebo)

CASI LA MITAD VIO SU PIEL

CON AL  
MENOS UN  
**75 %**

MENOS  
LESIONES

48 % frente al 13 % que no tomaba DUPIXENT

MUCHOS ADULTOS VIERON SU PIEL

CON AL  
MENOS UN  
**90 %**

MENOS  
LESIONES

33 % contra 7 % que no tomaba DUPIXENT

MÁS DEL  
TRIPLE DE  
PACIENTES

EXPERIMENTARON UNA REDUCCIÓN  
SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN

38 % frente al 11 % que no tomaba DUPIXENT



ANTHONY,  
PACIENTE REAL

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** No cambie ni suspenda sus otros medicamentos, incluidos los corticosteroides u otros medicamentos para el asma, sin consultar antes con su proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con esos medicamentos. Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.



KENNY,  
PACIENTE REAL

# RESULTADOS A LARGO PLAZO CON DUPIXENT® (dupilumab)

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT + CORTICOSTEROIDES TÓPICOS (CST)  
FRENTA A CST ÚNICAMENTE

LOS ADULTOS QUE PARTICIPARON EN UN ENSAYO DE 1 AÑO EXPERIMENTARON:

## PIEL CON MENOS LESIONES POR MÁS TIEMPO

A los 4 meses: 39 % con DUPIXENT + CST frente al 12 %  
con CST únicamente

A los 4 meses y al año: 22 % con DUPIXENT + CST frente al  
7 % con CST únicamente

## ALIVIO DURADERO DE LA PICAZÓN

A los 4 meses: 59 % con DUPIXENT + CST frente al 20 % con  
CST únicamente

Al año: 51 % con DUPIXENT + CST frente al 13 % con  
CST únicamente

## ALIVIO RÁPIDO DE LA PICAZÓN DESPUÉS DE LA PRIMERA DOSIS

A las 2 semanas: 18 % con DUPIXENT + CST frente al 8 %  
con CST únicamente

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede provocar reacciones alérgicas, incluidas reacciones cutáneas, que algunas veces pueden ser fuertes. Deje de usar DUPIXENT e infórmelo a su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, hinchazón del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo sarpullido que parece una diana o protuberancias rojas o azules dolorosas debajo de la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa (inglés y español) y la Información para el paciente (inglés y español) disponibles en el bolsillo trasero.

# PIEL CON MENOS LESIONES Y MENOS PICAZÓN PARA ADOLESCENTES

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT FRENTE A PLACEBO

LOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPARON EN UN ENSAYO CLÍNICO DE 4 MESES EXPERIMENTARON:

## PIEL SIGNIFICATIVAMENTE CON MENOS LESIONES

12 VECES MÁS PACIENTES

LOGRARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

24 % frente al 2 % que no tomaba DUPIXENT (placebo)

CASI LA MITAD VIO SU PIEL

CON AL MENOS UN  
**75 %**

MENOS LESIONES

42 % frente al 8 % que no tomaba DUPIXENT

ALGUNOS VIERON SU PIEL

CON AL MENOS UN  
**90 %**

MENOS LESIONES

23 % frente al 2 % que no tomaba DUPIXENT

## REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN

APROXIMADAMENTE  
7 VECES MÁS PACIENTES

EXPERIMENTARON UN ALIVIO DE LA PICAZÓN

37 % frente al 5 % que no tomaba DUPIXENT



OLIVIA,  
PACIENTE REAL



**PUEDES TOMAR DUPIXENT CON O SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)**

### RESULTADOS DE SEGURIDAD DE 1 AÑO:

Los resultados de seguridad a largo plazo en adolescentes que continuaron tomando DUPIXENT en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron consistentes con los ensayos clínicos en adultos.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (continuación): **Problemas oculares.** Dígame a su proveedor de atención médica si tiene nuevos problemas oculares o si nota un empeoramiento de los problemas que tenía, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un oftalmólogo para que le realicen un examen, si es necesario.

**Soriasis.** Esto puede ocurrir en personas con dermatitis atópica que reciben DUPIXENT. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en la piel. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un dermatólogo para que le realicen un examen, si es necesario.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

# MÁS NIÑOS EXPERIMENTARON ALIVIO

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT + CST FRENTE A CST ÚNICAMENTE

LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN UN ENSAYO DE 4 MESES EXPERIMENTARON:

## PIEL NOTABLEMENTE CON MENOS LESIONES

MÁS DEL DOBLE  
DE PACIENTES

LOGRARON UNA PIEL SIN  
LESIONES O CASI SIN LESIONES

Menos de 66 lb: 30 % en DUPIXENT + CST frente al 13 % en CST solamente

66 lb o más: 39 % en DUPIXENT + CST frente al 10 % en solo CST

MÁS DE LA MITAD VIO SU PIEL

CON AL  
MENOS UN  
**75 %**

MENOS  
LESIONES

Menos de 66 lb: 75 % con DUPIXENT + CST frente al 28 % con CST únicamente

66 lb o más: 75 % con DUPIXENT + CST frente al 26 % con CST únicamente

## REDUCCIÓN CONSIDERABLE DE LA PICAZÓN

APROXIMADAMENTE  
4,5 VECES MÁS  
PACIENTES

EXPERIMENTARON  
MENOS PICAZÓN

Menos de 66 lb: 54 % con DUPIXENT + CST frente al 12 % con CST únicamente

66 lb o más: 61 % con DUPIXENT + CST frente al 13 % con CST únicamente

La dosificación se basa en la edad y el peso. El médico de tu hijo te dirá cuánta cantidad de DUPIXENT debe administrarse y con qué frecuencia.



PUEDES TOMAR DUPIXENT CON O  
SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)

### RESULTADOS DE SEGURIDAD DE 1 AÑO:

Los resultados de seguridad a largo plazo en niños que continuaron tomando DUPIXENT con o sin CST en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron consistentes con los ensayos clínicos en adultos.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (continuación): Dolores en las articulaciones. Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenía. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrolla síntomas en las articulaciones.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

# INCLUSO TU HIJO MÁS PEQUEÑO PUEDE SANAR

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT + CST FRENTE A CST ÚNICAMENTE

LOS NIÑOS PEQUEÑOS QUE PARTICIPARON EN UN ENSAYO DE 4 MESES EXPERIMENTARON:

## PIEL NOTABLEMENTE CON MENOS LESIONES

7 VECES MÁS PACIENTES

LOGRARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

28 % con DUPIXENT + CST frente al 4 % con CST únicamente

MÁS DE LA MITAD VIO SU PIEL

CON AL MENOS UN  
**75 %**

MENOS LESIONES

53 % con DUPIXENT + CST frente al 11 % con CST únicamente

## REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN

MÁS DEL QUÍNTUPLE DE PACIENTES

EXPERIMENTARON MENOS PICAZÓN

48 % con DUPIXENT + CST frente al 9 % con CST únicamente



CAMERON,  
PACIENTE REAL



PUEDES TOMAR DUPIXENT CON O SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)

### RESULTADOS DE SEGURIDAD DE 1 AÑO:

Los resultados de seguridad a largo plazo en niños pequeños que continuaron tomando DUPIXENT con o sin CST en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron consistentes con los ensayos clínicos en adultos. Además, se reportaron casos de enfermedad de manos, pies y boca, y verrugas. En estos casos reportados, los pacientes continuaron el tratamiento con DUPIXENT.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Los efectos secundarios más comunes en pacientes con eczema incluyen reacciones en el lugar de la inyección, problemas oculares, que incluyen inflamación de los ojos y los párpados, enrojecimiento, hinchazón, picazón, infección ocular, ojo seco y visión borrosa, herpes en la boca o en los labios y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

# DUPIXENT® (dupilumab) Y TÚ

## TU GUÍA DE CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO

Independientemente de en qué etapa de tu tratamiento te encuentres tú o tu hijo, esta guía puede ayudarte a organizar tus pensamientos para tener una conversación productiva con tu especialista en eczema. Inicia la conversación acerca de DUPIXENT como una opción. No dejes pasar la oportunidad de ayudar a que tu piel o la de tu hijo sane.

### ¿ERES PACIENTE O CUIDADOR?

- Paciente  Cuidador

### ¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS O LOS DE TU SER QUERIDO RESPECTO DEL TRATAMIENTO CON DUPIXENT?

- Piel más limpia  Alivio de la picazón

### ¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE TÚ O TU SER QUERIDO TIENEN ECZEMA?

- Entre 0 y 2 años  Entre 2 y 5 años  Entre 5 y 10 años  Más de 10 años

### ¿QUÉ TRATAMIENTOS TE HAN RECETADO O HAS UTILIZADO PARA CONTROLAR TU ECZEMA O EL DE TU SER QUERIDO?

- Esteroides tópicos  Medicamentos biológicos  Ninguno  
 Fototerapia  Productos de venta libre  
 Esteroides orales  Otro \_\_\_\_\_

### DESCRIBE TUS SÍNTOMAS O LOS DE TU SER QUERIDO.

#### GRAVEDAD DE LA ERUPCIÓN

- Ninguna  Leve  Moderada  Grave

#### INTENSIDAD DE LA PICAZÓN

- Ninguna  Leve  Moderada  Grave

### ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE PRESENTAN ESTOS SÍNTOMAS?

#### PICAZÓN

- Nunca  Casi nunca  Ocasionalmente  Con frecuencia

#### PIEL INFLAMADA Y DESCOLORIDA

- Nunca  Casi nunca  Ocasionalmente  Con frecuencia

#### ÁREAS DE PIEL ENGROSADA Y ENDURECIDA

- Nunca  Casi nunca  Ocasionalmente  Con frecuencia

### ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN LOS BROTES?

- Cada pocos meses  Mensualmente  
 Semanalmente  Diariamente

### ...¿Y CUÁNTO DURAN?

- Entre 1 y 5 días  Entre 5 y 10 días  Entre 10 y 15 días  Más de 15 días

### ¿DÓNDE SE FOCALIZAN TUS SÍNTOMAS DEL ECZEMA?

- Cuello  Pecho  Estómago  Parte delantera de las rodillas  
 Rostro  Codos  Pies  Parte posterior de las rodillas  
 Manos  Tobillos  Cuero cabelludo  Otro \_\_\_\_\_

### DESCRIBE CUALQUIER OTRO EFECTO QUE HAYA TENIDO EL ECZEMA EN TU VIDA O LA DE TU SER QUERIDO.

---



---



---



---



**TOMA UNA FOTO DE TUS RESPUESTAS PARA COMPARTIRLA CON TU MÉDICO O CON EL DE TU HIJO EN LA PRÓXIMA CITA**

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Le recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch), o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

# CÓMO COLABORAR CON TU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA



## PRUEBA ESTOS CONSEJOS PARA QUE TU CONSULTA CON EL MÉDICO SEA PRODUCTIVA

Tener una conversación abierta con tu equipo de atención médica es el primer paso para trabajar en un plan de tratamiento que funcione para ti.

- ▶ NO TENGAS MIEDO DE HABLAR Y ABOGAR POR TI MISMO O POR UN SER QUERIDO
- ▶ TOMA FOTOS Y HAZ UN SEGUIMIENTO DE TUS SÍNTOMAS (O LOS DE TU SER QUERIDO)
- ▶ PREPARA TUS PREGUNTAS Y TEMAS PARA DISCUTIR CON TUS ESPECIALISTAS
- ▶ TOMA NOTAS Y LLÉVALAS A LAS CONSULTAS CON TU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA



SOPHIA,  
PACIENTE REAL



ENCUENTRA UN  
ESPECIALISTA CON  
HEALTHGRADES™



PÁGINA DE RECURSOS  
PARA CUIDADORES

RECURSOS DISPONIBLES  
EN DUPIXENT.COM

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Utilice DUPIXENT exactamente como se lo recetó su proveedor de atención médica. Es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Su proveedor de atención médica decidirá si usted o su cuidador puede inyectar DUPIXENT.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

# DOSIFICACIÓN DE DUPIXENT® (dupilumab):

	PESO CORPORAL	DOSIS DE CARGA INICIAL	DOSIS POSTERIOR
<b>ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS</b>	Cualquier peso	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg cada 2 semanas
<b>NIÑOS Y ADOLESCENTES 6 A 17 AÑOS</b>	132 libras o más	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg cada 2 semanas
	66 lb a menos de 132 lb	400 mg (dos inyecciones de 200 mg)	200 mg cada 2 semanas
	33 libras a menos de 66 libras	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg cada 4 semanas
	PESO CORPORAL	DOSIS INICIAL* Y POSTERIOR	
<b>NIÑOS PEQUEÑOS 6 MESES A 5 AÑOS</b>	33 libras a menos de 66 libras	300 mg cada 4 semanas	
	11 libras a menos de 33 libras	200 mg cada 4 semanas	

Tu médico te dirá cuánta cantidad de **DUPIXENT** inyectar y con qué frecuencia.

## DUPIXENT ESTÁ DISPONIBLE COMO PLUMA PRECARGADA O JERINGA PRECARGADA.

Tu médico decidirá si tú o un cuidador pueden inyectar DUPIXENT y les brindará la capacitación adecuada. DUPIXENT se administra mediante una inyección debajo de la piel (inyección subcutánea). Recuerda rotar el lugar de la inyección cada vez que administres DUPIXENT.



### PLUMA PRECARGADA

disponible en dosis de 200 mg y 300 mg para pacientes mayores de 2 años.

### JERINGA PRECARGADA

disponible en dosis de 200 mg y 300 mg para pacientes mayores de 6 meses.



**ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER VIDEOS DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE CÓMO ADMINISTRAR DUPIXENT**

\*Para niños pequeños, no se recomienda una dosis de carga inicial.

## DUPIXENT PUEDE SER ADMINISTRADO POR UN MÉDICO EN EL CONSULTORIO O POR UN CUIDADOR EN CASA:

- ▶ En niños de 6 meses a menos de 12 años, DUPIXENT debe ser administrado por un cuidador
- ▶ En adolescentes de 12 a 17 años, DUPIXENT debe ser administrado o supervisado por un adulto



**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** No intente preparar ni inyectar DUPIXENT hasta que su proveedor de atención médica le haya brindado capacitación a usted o su cuidador. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. En niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT. Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

**DUPIXENT**  
**myway** 

## CONTIGO EN CADA PASO DEL CAMINO

Una vez que te hayan recetado DUPIXENT, el programa de apoyo al paciente *DUPIXENT MyWay* está aquí para ayudarte a responder las preguntas que puedas tener sobre DUPIXENT. Ten en cuenta que tu médico sigue siendo el mejor recurso si tienes alguna pregunta sobre tu eczema o tu programa de tratamiento.

Para inscribirte en *DUPIXENT MyWay* y acceder a recursos útiles, llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936) y selecciona la Opción 1.



SOPHIA,  
PACIENTE REAL

## ESTAMOS CONTIGO

Es importante saber que *DUPIXENT MyWay* ayuda a los adultos y cuidadores de niños que están por comenzar o en tratamiento con DUPIXENT.



Una vez que estés inscrito en el programa, y mientras se confirman tus beneficios de seguro para DUPIXENT, recibirás una llamada de bienvenida de tu **administrador de casos**, quien te explicará el apoyo disponible de *DUPIXENT MyWay*. Además, tu **administrador de casos** puede ofrecerte educación y apoyo para ayudarte a comenzar y mantenerte encaminado con tu tratamiento.



Tu **administrador de casos de DUPIXENT MyWay** puede responder tus preguntas sobre DUPIXENT, organizar que recibas capacitación complementaria sobre inyecciones, y ayudarte a comenzar y mantenerte encaminado.



Con la **aplicación para pacientes de DUPIXENT MyWay**, personas como tú pueden acceder a herramientas para ayudarles a comenzar y mantenerse encaminados con su tratamiento. Comunícate con tu **administrador de casos** para recibir una invitación con instrucciones sobre cómo obtener la aplicación.



El **Programa de Mentores DUPIXENT MyWay** te brinda la oportunidad de hablar con otros pacientes y cuidadores de DUPIXENT para escuchar sus experiencias.



ESCANEA AQUÍ PARA CONOCER RECURSOS ADICIONALES DE *DUPIXENT MyWay*

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.



## TU COPAGO PODRÍA SER TAN SOLO \$0\*

El Programa de Tarjeta de Copago *DUPIXENT MyWay* puede ayudar a reducir el costo de bolsillo de *DUPIXENT*. Los pacientes elegibles con seguro médico comercial pueden **pagar tan solo \$0\*** en copago por cada receta de *DUPIXENT*® (dupilumab). Se aplican términos y condiciones.

### PUEDES SER ELEGIBLE SI:

- ▶ Tienes un seguro médico comercial
- ▶ Tienes una receta de *DUPIXENT* para una afección aprobada por la FDA
- ▶ Resides en los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- ▶ Eres un paciente o cuidador mayor de 18 años

*\*Sujeto al máximo del programa por paciente por año calendario. La aprobación no está garantizada. NO ES UN SEGURO MÉDICO. No válido para recetas pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluidos los programas estatales de asistencia farmacéutica. Este programa no es válido donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o esté restringido. *DUPIXENT MyWay* se reserva el derecho de rescindir, revocar, terminar o enmendar esta oferta, elegibilidad y términos de uso en cualquier momento sin previo aviso. Los ahorros que proporcione el programa pueden variar según los gastos de bolsillo de cada paciente. El programa tiene como fin ayudar a los pacientes a afrontar el costo de *DUPIXENT*. Los pacientes podrían tener planes de seguro que intentan diluir el impacto de la asistencia disponible bajo el programa. En esas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Se aplican términos y condiciones adicionales.*

## OTRAS OPCIONES DE APOYO

A través del Programa de Asistencia para Pacientes, los pacientes elegibles que no tengan seguro médico o cuyo seguro no cubra el tratamiento podrían recibir *DUPIXENT* sin costo alguno si cumplen con los requisitos.

Quienes cumplan con los requisitos deben ser mayores de 18 años, residentes de los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y demostrar una necesidad financiera.

**Llama a *DUPIXENT MyWay*® al 1-844-387-4936 para obtener información completa sobre el programa y los criterios de elegibilidad.**



**TYLER,  
PACIENTE REAL**



**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección  
200mg · 300mg

**AYUDA  
A SANAR  
TU PIEL  
DESDE  
ADENTRO**

**MÁS DE 696,650\* PACIENTES  
RECETADOS CON DUPIXENT**

**LILA,  
PACIENTE REAL**



**ESCANEA PARA  
SABER MÁS**

\*Pacientes adultos y pediátricos nuevos (6 meses o más) con eczema moderado a grave no controlado. Datos de la Fuente Nacional de Negocios (NSOB, por sus siglas en inglés) de IQVIA hasta junio de 2025.

**PREGUNTA A TU ESPECIALISTA EN ECZEMA SOBRE DUPIXENT Y  
VISITA DUPIXENT.COM O LLAMA AL 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)**

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT<sup>®</sup>.**

**Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa (inglés y español) y la Información para el paciente (inglés y español) disponibles en el bolsillo trasero.**

**sanofi | REGENERON<sup>®</sup>**

© 2025 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. DUPIXENT<sup>®</sup> y DUPIXENT MyWay<sup>®</sup> son marcas registradas de Sanofi Biotechnology. US.DUP.25.08.0182 11/25