

DUPIXENT[®]
(dupilumab) Inyección
200mg · 300mg

AYUDA A
CONTROLAR TU
ECZEMA
DESDE
ADENTRO

MANTENTE UN PASO ADELANTE DEL ECZEMA CON DUPIXENT

Disponible para pacientes desde los 6 meses de edad, con eczema (dermatitis atópica) moderado a grave no controlado



Pacientes reales.
Los resultados individuales
pueden variar.

INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado a grave, que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas que se aplican sobre la piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan utilizar terapias tópicas. DUPIXENT puede utilizarse con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 meses que tengan dermatitis atópica.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en inglés o español, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

KENNY, PACIENTE REAL

Pasión: Instructor de Kung-Fu

"Antes de usar DUPIXENT, me picaba mucho la piel, especialmente cuando entrenaba".

APRENDE A VER LAS SEÑALES

El eczema (dermatitis atópica) moderado a grave no controlado puede ser difícil de manejar. Podrías estar haciendo todo correctamente y aún presentar síntomas. Es posible que desees preguntarle a tu médico acerca de hacer un cambio en tu tratamiento.

HABLA CON UN ESPECIALISTA EN ECZEMA SI TÚ O TU HIJO/A (DE 6 MESES DE EDAD O MÁS):

- ▶ OCULTAN SU PIEL
- ▶ TIENEN ECZEMA QUE CONTINÚA REAPARECIENDO
- ▶ TOMAN ESTEROIDES ORALES MÁS DE UNA VEZ AL AÑO
- ▶ TOMAN INMUNOSUPRESORES MÁS DE UNA VEZ AL AÑO



Recuerda que la comunicación es el primer paso para sentirse mejor. Escanea este código QR para descargar nuestra Guía de discusión para hablar con tu médico y así ayudar a iniciar la conversación con tu médico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No uses este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a alguno de los ingredientes en DUPIXENT®. Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo: si tienes problemas oculares; si tienes una infección parasitaria (helmintos); si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una "vacuna viva" antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

UNA DIFERENCIA POR DENTRO Y POR FUERA

Cuando los medicamentos tópicos recetados no son suficientes y tus síntomas y brotes continúan reapareciendo, es hora de probar un tipo de tratamiento diferente. DUPIXENT es un tratamiento innovador para el eczema moderado a grave no controlado.

DUPIXENT:

- ▶ **ES UN MEDICAMENTO BIOLÓGICO QUE AYUDA A BLOQUEAR UNA FUENTE PRINCIPAL DE INFLAMACIÓN EN EL INTERIOR DE TU CUERPO QUE PUEDE CAUSAR ECZEMA**
- ▶ **TE AYUDA A MANTENERTE UN PASO ADELANTE DE LOS SÍNTOMAS PARA TENER UNA PIEL CON MENOS LESIONES Y MENOS PICAZÓN**
- ▶ **TRATA TU ECZEMA DE FORMA CONTINUA, INCLUSO ENTRE BROTES**
- ▶ **NO ES UN ESTEROIDE NI UN INMUNOSUPRESOR**



GRACE, PACIENTE REAL
Pasión: Fútbol

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo (cont.): si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación. Un registro de embarazo para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé. Para inscribirte o para obtener más información, llama al 1-877-311-8972 o visita <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>; si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).




CHLOE, PACIENTE REAL
Pasión: Surfear

**A MÁS DE
270,000
PACIENTES
SE LES HA RECETADO
DUPIXENT**

*Nuevos pacientes adultos y pediátricos (de 6 meses de edad o más) con eczema moderado a grave no controlado.

Datos de la Fuente Nacional de Negocios (National Source of Business, NSOB) de IQVIA hasta 7/15/2022

DUPIXENT 
(dupilumab) Inyección
200mg · 300mg

CRISTAL, PACIENTE REAL

Pasión: Coreografía

“Cuando me mantengo un paso adelante de mi eczema, no me preocupo tanto por mi piel”.

TOMA EL CONTROL RECIBE TU INYECCIÓN CONTRA EL ECZEMA

Muchas personas con eczema moderado a grave tienen un sistema inmunológico excesivamente activo que produce más inflamación debajo de la piel de lo normal. DUPIXENT es un medicamento biológico que ayuda a bloquear una fuente principal de inflamación dentro de tu cuerpo que puede causar eczema. Trata de manera continua el eczema en el interior para así ayudar a sanar tu piel en el exterior.

Los medicamentos biológicos se procesan en el cuerpo de manera diferente a los medicamentos orales o tópicos. La mayoría de los medicamentos biológicos vienen en forma líquida y deben administrarse mediante inyección.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Especialmente, infórmale a tu proveedor de atención médica si estás tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados, o si tienes dermatitis atópica y asma y usas un medicamento para el asma. **No cambies ni suspendas tu medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar primero con tu proveedor de atención médica.** Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic [aquí](#) para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



ESCANEA EL CÓDIGO PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE CÓMO DUPIXENT
PUEDE AYUDAR

ADULTOS (18 AÑOS O MÁS)

DUPIXENT
(dupilumab) inyección
200mg · 300mg

SANAR TU PIEL DESDE ADENTRO ES ALGO PODEROSO

En un ensayo clínico de 52 semanas de duración, los adultos que usaron DUPIXENT + un corticosteroide tópico (CST) (en comparación con los que usaron un CST únicamente) presentaron:

UNA PIEL CON MENOS LESIONES POR MÁS TIEMPO

CASI 3 VECES MÁS

ADULTOS PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

A las 16 semanas, el 39% que usó DUPIXENT + corticosteroides tópicos (CST) presentó una piel sin lesiones o casi sin lesiones frente al 12% que usó CST únicamente. El 22% presentó una piel sin lesiones o casi sin lesiones a las 16 y las 52 semanas frente al 7%, respectivamente.

ALIVIO RÁPIDO Y DURADERO DE LA PICAZÓN

CASI 4 VECES MÁS

PERSONAS TUVIERON UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN AL AÑO

El 51% de los adultos a las 52 semanas presentó una reducción significativa de la picazón al usar DUPIXENT + CST frente al 13% que usó CST únicamente. El 59% de los adultos presentó una picazón significativamente menor frente al 20% que usó CST únicamente, a las 16 semanas y el 18% de los adultos presentó una reducción de la picazón en apenas 2 semanas frente al 8% que usó CST únicamente.


En otro tipo de estudio (de extensión abierta) de adultos que continuaron con DUPIXENT a largo plazo durante casi 3 años (148 semanas), los resultados de seguridad fueron generalmente coherentes con los observados en los ensayos clínicos de adultos.

Los efectos secundarios más comunes observados en los ensayos clínicos fueron reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluye enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, herpes en la boca o en los labios, y alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

MOSETTA, PACIENTE REAL

Pasión: Entusiasta del fitness
"Antes de usar DUPIXENT, el eczema hacía que mi piel se sintiera tan incómoda que era difícil hacer ejercicio".



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA ESCUCHAR HISTORIAS
DE PACIENTES REALES.



JOLIE, PACIENTE REAL

Pasión: Danza

"Tenía mucha picazón en mi piel, en especial con mi vestido de baile. Pero ahora noto la diferencia".

UN PASO ADELANTE CON MENOS LESIONES Y MENOS PICAZÓN

En un ensayo clínico separado, a las 16 semanas, los adolescentes (de 12 a 17 años) que usaron DUPIXENT (en comparación con los que no usaron DUPIXENT) presentaron:

UNA PIEL CON MENOS LESIONES CASI 12 VECES MÁS

ADOLESCENTES PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

El 24% frente al 2% que no usó DUPIXENT

NOTABLEMENTE MENOS PICAZÓN CASI 7 VECES MÁS

ADOLESCENTES PRESENTARON ALIVIO DE LA PICAZÓN

El 37% frente al 5% que no usó DUPIXENT

RESULTADOS COMPROBADOS

≥ 75% DE MEJORAMIENTO EN LA PIEL EN
CASI LA MITAD DE LOS ADOLESCENTES

ALGUNOS PRESENTARON **≥ 90%** DE MEJORAMIENTO EN LA PIEL

El 42% frente al 8% en los adolescentes que no usaron DUPIXENT y el 23% frente al 2% que no usó DUPIXENT, respectivamente

En otro tipo de estudio (de extensión abierta) de niños (de 6 meses a 17 años de edad) que continuaron usando DUPIXENT a largo plazo durante 1 año, los resultados de seguridad para adolescentes (de 12 a 17 años) fueron coherentes con los observados en los ensayos clínicos en adultos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen: Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser graves. Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si tienes alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o calambres en el área del estómago.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

RESULTADOS QUE ELLOS PUEDEN VER RESULTADOS QUE ELLOS PUEDEN SENTIR

Cuidar a tu hijo con eczema moderado a grave no controlado puede ser una lucha, especialmente cuando estás tratando constantemente de evitar los factores desencadenantes.

En un ensayo clínico, a las 16 semanas, más niños (de 6 a 11 años) que usaron DUPIXENT y un corticosteroide tópico (CST) presentaron:

UNA PIEL CON MENOS LESIONES > 2 VECES MÁS

NIÑOS PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

El 30% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 13% que usó CST únicamente

El 39% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 10% que usó CST únicamente

NOTABLEMENTE MENOS PICAZÓN CASÍ 4.5 VECES MÁS

NIÑOS PRESENTARON MENOS PICAZÓN

El 54% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 12% que usó CST únicamente

El 61% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 13% que usó CST únicamente

RESULTADOS COMPROBADOS

≥ 75% DE MEJORAMIENTO EN LA PIEL EN MÁS DE LA MITAD DE LOS NIÑOS

El 75% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 28% que usó CST únicamente

El 75% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 26% que usó CST únicamente

Tu proveedor de atención médica te dirá cuánto DUPIXENT inyectar y con qué frecuencia.

En otro tipo de estudio (de extensión abierta) de niños (de 6 meses a 17 años de edad) que continuaron usando DUPIXENT a largo plazo durante 1 año, los resultados de seguridad para niños (de 6 a 11 años) fueron coherentes con los observados en los ensayos clínicos en adultos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen (cont.): Problemas oculares. Infórmale a tu proveedor de atención médica si tienes problemas oculares nuevos o si notas un empeoramiento de los problemas que tenías, incluido dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Tu proveedor de atención médica puede referirte a un oftalmólogo para que te realicen un examen de la vista, si es necesario.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



GRACE, PACIENTE REAL
Pasión: Fútbol



No es una paciente real.

NIÑOS (DE 6 MESES A 5 AÑOS)

SANA LA PIEL DE TU PEQUEÑO DESDE ADENTRO

DUPIXENT es el único medicamento biológico aprobado por la FDA para el tratamiento del eczema moderado a grave no controlado en niños desde los 6 meses de edad.

En un ensayo clínico, a las 16 semanas, un número significativamente mayor de niños (de 6 meses a 5 años) que usaron DUPIXENT y un corticosteroide tópico (CST) presentó:

UNA PIEL CON MENOS LESIONES 7 VECES MÁS

NIÑOS PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

El 28% que usó DUPIXENT + CST frente al 4% que usó CST únicamente

ALIVIO DE LA PICAZÓN CASI 5 VECES MÁS

NIÑOS PRESENTARON MENOS PICAZÓN

El 48% que usó DUPIXENT + CST frente al 9% que usó CST únicamente

RESULTADOS COMPROBADOS

≥ 75% DE MEJORAMIENTO EN LA PIEL EN LA MITAD DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS

El 53% que usó DUPIXENT + CST frente al 11% que usó CST únicamente

En otro tipo de estudio (de extensión abierta) de niños (de 6 meses a 17 años de edad) que continuaron usando DUPIXENT a largo plazo durante 1 año, los resultados de seguridad para niños pequeños (de 6 meses a 5 años) fueron coherentes con los observados en los ensayos clínicos en adultos. En niños pequeños, se notificó la enfermedad de manos, pies y boca, y el papiloma cutáneo (verrugas) en el estudio de extensión abierta. En estos casos notificados, los pacientes continuaron el tratamiento con DUPIXENT.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen (cont.): Dolores en las articulaciones. Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizados. Infórmele a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenía. Tu proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

AYUDA A MEJORAR CÓMO TU PIEL SE VE Y SE SIENTE

El eczema puede afectar a cualquier persona, independientemente de su raza, origen étnico o género, y puede aparecer de manera diferente en diferentes tipos de piel. En algunos casos, el sarpullido del eczema podría verse rojo, gris, marrón o morado. DUPIXENT ha demostrado una eficacia generalmente constante independientemente de la raza/origen étnico en estudios con adultos.



Paciente real de 4 años en el ensayo clínico.[†] Los resultados individuales pueden variar.

*Este paciente adulto fue un paciente real tratado con DUPIXENT. No es un paciente de los ensayos clínicos. La puntuación fue designada por el médico tratante. Al ser un paciente del mundo real, otros factores pueden haber influido en los resultados de su tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.

[†]A todos los pacientes se les recetaron corticosteroides tópicos (CST) de potencia baja o media según el programa del ensayo clínico.



Paciente adulto real*.



Paciente real de 6 años de edad en el ensayo clínico.[†] Los resultados individuales pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Los efectos secundarios más comunes en pacientes con eczema son reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, herpes en la boca o en los labios, y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

DOSIFICACIÓN DE DUPIXENT[®] (dupilumab):

	PESO CORPORAL	DOSIS DE CARGA INICIAL	DOSIFICACIÓN POSTERIOR
ADULTOS DE 18 AÑOS O MÁS	Cualquier peso	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg; cada 2 semanas
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 17 AÑOS DE EDAD	132 lb o más	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg; cada 2 semanas
	66 lb a menos de 132 lb	400 mg (dos inyecciones de 200 mg)	200 mg; cada 2 semanas
	33 lb a menos de 66 lb	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg; cada 4 semanas
	PESO CORPORAL	DOSIFICACIÓN INICIAL* Y POSTERIOR	
NIÑOS DE 6 MESES A 5 AÑOS DE EDAD	33 lb a menos de 66 lb	300 mg; cada 4 semanas	
	11 lb a menos de 33 lb	200 mg; cada 4 semanas	

*Para niños de 6 meses a 5 años de edad con dermatitis atópica, no se recomienda una dosis de carga inicial.

DUPIXENT está disponible en forma de pluma precargada o jeringa precargada.

Tu médico te dirá cuánto DUPIXENT inyectar y con qué frecuencia, después de que recibas la capacitación adecuada. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Se debe alternar el lugar de la inyección cada vez que se administre DUPIXENT.



Pluma precargada: disponible en dosis de 200 mg y 300 mg para pacientes de 2 años o más



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER EL VIDEO
DE CONSEJOS Y
TRUCOS SOBRE
CÓMO ADMINISTRAR
DUPIXENT



Jeringa precargada: disponible en dosis de 200 mg y 300 mg para pacientes de 6 meses o más

DUPIXENT puede ser administrado por un médico en el consultorio o por un cuidador en tu hogar:

- ▶ en niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador debe administrar DUPIXENT
- ▶ en adolescentes de 12 a 17 años, DUPIXENT debe ser administrado por o bajo la supervisión de un adulto



LEI ANN, PACIENTE REAL
Pasión: Viajar

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Usa DUPIXENT exactamente según lo prescrito por tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

DUPIXENT myway

CONTIGO EN CADA PASO DEL CAMINO

Una vez que te hayan recetado DUPIXENT, el programa de apoyo al paciente *DUPIXENT MyWay*® está aquí para ayudarte a responder las preguntas que puedas tener sobre DUPIXENT. Ten en cuenta que tu médico continúa siendo el mejor recurso para ti si tienes alguna pregunta sobre tu eczema o tu programa de tratamiento.

Para inscribirte en *DUPIXENT MyWay*® y acceder a recursos útiles, llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936) y selecciona la opción 1.



KEVIN, PACIENTE REAL
Pasión: Bombero voluntario

NO ESTÁS SOLO

Es importante saber que *DUPIXENT MyWay*® ayuda a personas como tú que están iniciando un tratamiento con DUPIXENT o que ya están en tratamiento.



Para los pacientes elegibles, inscribirse en *DUPIXENT MyWay* puede ayudar a garantizar que recibas DUPIXENT lo más rápido posible y que recibas apoyo adicional a lo largo del recorrido de tu tratamiento.



Podemos ayudar a ponerte en contacto con un **Enfermero Educador** para responder tus preguntas sobre DUPIXENT, ayudarte a programar tus entregas, brindarte capacitación complementaria para la inyección y ayudarte a comenzar y mantenerte en el camino correcto.



Con la aplicación de *DUPIXENT MyWay Patient App*, desarrollada por Medisafe, las personas como tú pueden obtener acceso a herramientas que te ayudarán a comenzar y mantenerte en camino con tu tratamiento. Comunícate con tu **Enfermero Educador** para obtener una invitación con instrucciones sobre cómo obtener la aplicación.



El **Programa de Mentores *DUPIXENT MyWay*** te brinda la oportunidad de hablar con otros pacientes y cuidadores para escuchar sus experiencias.



ESCANEA AQUÍ PARA OBTENER
INFORMACIÓN SOBRE
RECURSOS ADICIONALES DE
DUPIXENT MYWAY.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años o más, se recomienda que DUPIXENT sea administrado por un adulto o bajo la supervisión de un adulto. En niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



¿NECESITAS AYUDA PARA EL PAGO?

El Programa de Tarjeta de Copago *DUPIXENT MyWay* podría ayudar a reducir los gastos de bolsillo de *DUPIXENT*. Los pacientes elegibles podrían pagar tan solo \$0* por abastecimiento de cada receta de *DUPIXENT* (máximo de \$13,000 por paciente, por año calendario)*.

UN COPAGO TAN BAJO COMO \$0* PODRÍA ESTAR DISPONIBLE SI:

- ▶ Tienes seguro médico comercial
- ▶ Tienes una receta de *DUPIXENT* para una afección aprobada por la FDA
- ▶ Resides en uno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- ▶ Eres un paciente o cuidador de 18 años o más

**La aprobación no está garantizada. El programa tiene un máximo anual de \$13,000. NO ES UN SEGURO. No es válido para recetas pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluidos los programas estatales de asistencia farmacéutica. Este programa no es válido donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o esté restringido. *DUPIXENT MyWay* se reserva el derecho de rescindir, revocar, terminar o enmendar esta oferta, elegibilidad y términos de uso en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier tipo de ahorro proporcionado por el programa puede variar según los costos de bolsillo de los pacientes. El programa tiene como fin ayudar a los pacientes a afrontar el costo de *DUPIXENT*. Los pacientes podrían tener planes de seguro que intentan diluir el impacto de la asistencia disponible bajo el programa. En esas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Se aplican términos y condiciones adicionales.*

OTRAS OPCIONES DE APOYO

A través del Programa de Asistencia al Paciente, los pacientes que no tienen seguro o que no están asegurados por su proveedor de seguros podrían recibir *DUPIXENT* sin cargo si cumplen con ciertos requisitos.

Para cumplir con los requisitos, se deberá tener al menos 18 años de edad o más, ser residente de uno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico, y demostrar una necesidad financiera.

Llama a *DUPIXENT MyWay* al 1-844-387-4936 para obtener información completa sobre el programa y los criterios de elegibilidad.



AYUDA A CONTROLAR TU ECZEMA DESDE ADENTRO

PREGÚNTALE A TU ESPECIALISTA
EN ECZEMA SOBRE DUPIXENT Y
VISITA DUPIXENT.COM
O LLAMA AL 1-844-DUPIXENT
(1-844-387-4936)



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN SOBRE
DUPIXENT

TYLER, PACIENTE REAL
Pasión: Kayak

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No uses este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a alguno de los ingredientes en **DUPIXENT**[®].

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad que figura en todo el folleto, y haz clic aquí para obtener la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#), incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

sanofi | **REGENERON**[®]