

幫助修護皮膚就從體內開始™

經美國食品和藥物管理局 (FDA) 核准，適用於6個月以上，患有難以控制的中度至重度濕疹患者。

DUPIXENT是皮膚專科醫生和過敏症專科醫生對濕疹處方生物治療的第一選擇¹。

難以控制的中度至重度濕疹 (異位性皮膚炎) 可能很難處理。當您或您的家人出現以下症狀，您應該考慮與濕疹專家諮詢：

- ▶ 濕疹反覆發作
- ▶ 一年服用超過一次的口服類固醇
- ▶ 一年使用超過一次的免疫抑制劑
- ▶ 遮住患部皮膚以避免被他人看到



請記住，與醫療保健提供者進行良好的溝通是改善您對濕疹感受的第一步。掃描此二維碼下載我們的醫生諮詢指南，並與您的專科醫生開啟對話。



在一項為期16週的臨床試驗中，青少年 (12至17歲) 有以下結果：
皮膚改善或幾乎改善 (24%的人觀察到皮膚改善或幾乎改善 vs 使用安慰劑的患者中，有2%的人觀察到皮膚改善或幾乎改善)
明顯減少搔癢 (使用DUPIXENT的患者中，有37%的人感受到搔癢緩解 vs 使用安慰劑的患者中，有5%的人感受到搔癢緩解)

KAYDEN
實際病例

由內而外的改變

當草本療法、整體療法與局部處方藥物都不能有效控制病情，也許是時候該考慮不同的治療方式。DUPIXENT是一種突破性的生物製劑治療藥物，用於治療6個月以上患難以控制的中度至重度濕疹的患者。

DUPIXENT是一種生物製劑：



幫助您從體內修護皮膚



有助於阻擋體內可引起濕疹的主要發炎來源之一



有助於您及早控制症狀，維持肌膚更完好的狀態，減輕搔癢情況



即使在非發作期間，它也能持續治療濕疹



不是類固醇藥物或免疫抑制劑



根據處方資訊，不需初始或常規血液檢查



可與或不與局部皮質類固醇併用



不需要每天使用



在15項臨床試驗中進行了研究 (6項針對濕疹，9項針對其它4種疾病)

什麼是生物製劑？

生物製劑是在活細胞內製造的特殊藥物，旨在針對某特定疾病所涉及的免疫系統特定部分。它們在體內的處理方式與口服或局部用藥不同。為了有效且正常運作，大多數生物製劑須透過注射方式給藥。

適應症

DUPIXENT是一種處方藥，用於治療患中度至重度濕疹 (異位性皮膚炎或AD) 的成人和6個月以上的兒童。不適合使用局部療法。DUPIXENT可以單獨使用或與局部皮質類固醇藥物一同使用。對未滿6個月異位性皮膚炎兒童患者的安全性和有效性尚未確定。

重要安全資訊

如果您對dupilumab或DUPIXENT®中的何成分過敏，請勿使用。

請查閱所有重要安全資訊，以及隨附包含患者資訊的完整處方說明。

您可以看到並 感受到的結果...

在兩個為期16週的成年人臨床試驗中：

有約4倍的人觀察到 皮膚改善或幾乎改善

使用DUPIXENT的患者中，有37%的人觀察到皮膚改善或幾乎改善 vs 未使用DUPIXENT(安慰劑)的患者中，有9%的人觀察到皮膚改善或幾乎改善

顯著減少搔癢感的比例 增加了三倍以上

使用DUPIXENT的患者中，有38%的人感受到搔癢緩解 vs 未使用DUPIXENT(安慰劑)的患者中，有11%的人感受到搔癢緩解

長期安全紀錄

針對成人約五年的安全性研究結果

針對成年人的長期使用安全性的延伸試驗研究顯示，其安全性結果與最初的臨床試驗一致。

最常見的副作用包括：注射部位反應，眼部和眼瞼發炎如發紅、腫脹、搔癢，有時伴有視力模糊、眼乾，口腔或嘴唇上出現口腔皰疹，以及特定白血球計數過高（嗜酸性白血球增多症）。



請掃描二維碼，查看更多
DUPIXENT在不同年齡組的結果。



KATHY
實際病例

重要安全資訊(續)

在使用DUPIXENT前，請告訴醫療保健提供者您所有醫療狀況，包括您是否有眼部問題、寄生蟲(蠕蟲)感染或計劃接種任何疫苗。在使用DUPIXENT治療前和治療期間，請勿接種「活性疫苗」。

請查閱所有重要安全資訊，以及隨附包含患者資訊的完整處方說明。


TYLER
實際病例

DUPIXENT
myway

每一步都與您同行

當您被開立DUPIXENT處方後，DUPIXENT MyWay®患者支持計劃將協助解答您在使用DUPIXENT時可能產生的任何問題。請記住，如果您對您的濕疹或治療計劃有任何疑問，您的醫生仍然是您最好的依靠。

註冊DUPIXENT MyWay®並獲得實用的資源，請致電1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)，選擇選項1。



DUPIXENT MyWay Copay Card可幫助符合資格、擁有商業保險的患者支付DUPIXENT的自付額。符合商業健康保險涵蓋資格的患者，每次領取DUPIXENT®藥品可能只需支付最多 \$0 的自付額（每位患者每年最高 \$13,000*）。您可以在線上註冊並透過電子郵件獲取您的卡片。有條款和條件限制。

*年度最高支付金額可能會有所變動

重要安全資訊 (續)

在使用DUPIXENT之前，請告訴醫療保健提供者您所有醫療狀況，包括您是否：懷孕或計劃懷孕。目前尚不清楚DUPIXENT是否會對胎兒造成傷害。為在懷孕期間使用DUPIXENT的婦女設立懷孕登錄。設立該登錄的目的是收集有關您和胎兒的健康資訊。您可以致電1-877-311-8972或瀏覽<https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>自行註冊或獲得有關登錄的更多資訊。正在哺乳或計劃哺乳。尚不清楚DUPIXENT是否會進入母乳。

請查閱所有重要安全資訊，以及隨附包含患者資訊的完整處方說明。



重要安全資訊(續)

請告知您的醫療保健提供者您的所有用藥情況，包括處方藥和非處方藥、維生素和草本保健品。

特別是如果您正在口服、使用局部或吸入性皮質類固醇藥物，患有異位性皮膚炎或氣喘並正在使用氣喘藥，請告知您的醫療保健提供者。請勿在未與您的醫療保健提供者溝通的情況下更換或停用皮質類固醇藥物或其他氣喘藥物。這可能會導致由皮質類固醇藥物或其他氣喘藥物控制的其他症狀復發。

DUPIXENT可能導致嚴重的副作用，包括：

- **過敏反應。** 使用DUPIXENT可能導致過敏反應，有時可能非常嚴重。如果您出現以下跡象或症狀，請停用DUPIXENT，並告知您的醫療保健提供者或立即尋求急診幫助：呼吸困難或喘鳴，臉部、嘴唇、口腔、舌頭或喉嚨腫脹，暈厥、暈眩、感覺頭重腳輕，脈搏加快，發燒，蕁麻疹，關節疼痛，全身不適，搔癢，皮疹，淋巴結腫大，噁心或嘔吐，或胃部痙攣。
- **眼部問題。** 如果您有任何新出現的眼部問題或眼部問題惡化，包括眼痛或視力改變，如視線模糊，請告知您的醫療保健提供者。必要時，醫療保健提供者可能會建議您就醫眼科醫生，進行眼部檢查。
- **關節疼痛。** 使用DUPIXENT的患者可能會出現關節疼痛症狀。有些患者由於關節症狀而行走或移動困難，在某些情況下需要住院治療。如果出現任何新的關節症狀或症狀惡化，請告知您的醫療保健提供者。如果您出現關節症狀，您的醫療保健提供者可能會停用DUPIXENT。

濕疹患者最常見的副作用包括注射部位反應，眼部和眼瞼發炎如發紅、腫脹、搔癢，有時伴有視力模糊、眼乾，口腔或嘴唇上出現口腔皰疹，以及特定白血球計數過高（嗜酸性白血球增多症）。

如果有任何副作用困擾您或持續存在，請告知醫療保健提供者。這些並不是DUPIXENT可能產生的所有副作用。關於副作用，請致電醫生尋求醫療建議。我們鼓勵您向FDA通報處方藥的不良副作用。請瀏覽www.fda.gov/medwatch，或致電1-800-FDA-1088。

請嚴格按照醫療保健提供者的處方使用DUPIXENT。這是一種皮下注射藥物。您的醫療保健提供者將決定您或您的照護者是否可以操作DUPIXENT的注射。**在您或您的照護者接受醫療保健提供者的訓練之前，請勿嘗試注射DUPIXENT。**對於12歲以上的兒童，建議由成人施打或在成人的監督下施打DUPIXENT。對於6個月但未滿12歲的兒童，應由照護者施打DUPIXENT。

請查閱所有重要安全資訊，以及隨附包含患者資訊的完整處方說明。

sanofi | **REGENERON**®