

幫助修護皮膚就從體內開始[™]

經美國食品和藥物管理局 (FDA) 核准，適用於6個月以上，患有難以控制的中度至重度濕疹患者。

DUPIXENT是皮膚專科醫生和過敏症專科醫生對濕疹進行生物治療的第一選擇¹。

難以控制的中度至重度濕疹(異位性皮膚炎)可能很難處理。當您或您的家人出現以下症狀，您應該考慮與濕疹專家諮詢：

- ▶ 濕疹反覆發作
- ▶ 一年服用超過一次的口服類固醇
- ▶ 一年使用超過一次的免疫抑制劑
- ▶ 遮住患部皮膚以避免被他人看到



請記住，與醫療保健提供者進行良好的溝通是改善您對濕疹感受的第一步。掃描此二維碼下載我們的醫生諮詢指南，並與您的專科醫生開啟對話。



在一項為期16週的臨床試驗中，青少年(12至17歲)有以下結果：皮膚改善或幾乎改善(24%的人觀察到皮膚改善或幾乎改善 vs 使用安慰劑的患者中，有2%的人觀察到皮膚改善或幾乎改善)明顯減少瘙癢(使用DUPIXENT的患者中，有37%的人感受到瘙癢緩解 vs 使用安慰劑的患者中，有5%的人感受到瘙癢緩解)

KAYDEN
實際病例

由內而外的改變

當草本療法、整體療法與局部處方藥物都不能有效控制病情，也許是時候該考慮不同的治療方式。DUPIXENT是一種突破性的生物製劑治療藥物，用於治療6個月以上患難以控制的中度至重度濕疹的患者。

DUPIXENT是一種生物製劑：



幫助您從體內修護皮膚



有助於阻擋體內可引起濕疹的主要發炎來源之一



有助於您及早控制症狀，維持肌膚更完好的狀態，減輕瘙癢情況



即使在非發作期間，它也能持續治療濕疹



不是類固醇藥物或免疫抑制劑



根據處方資訊，不需初始或常規血液檢查



可與或不與局部皮質類固醇併用



不需要每天使用



在15項臨床試驗中進行了研究(6項針對濕疹，9項針對其它4種疾病)

什麼是生物製劑？

生物製劑是在活細胞內製造的特殊藥物，旨在針對某特定疾病所涉及的免疫系統特定部分。它們在體內的處理方式與口服或局部用藥不同。為了有效且正常運作，大多數生物製劑須透過注射方式給藥。

適應症

DUPIXENT是一種處方藥，用於治療患有中度至重度濕疹(異位性皮膚炎或AD)且對局部處方治療控制不佳或不適合使用該療法的成人和6個月以上的兒童患者。DUPIXENT可以單獨使用或與局部皮質類固醇藥物一同使用。尚不清楚DUPIXENT對患有異位性皮膚炎的未滿6個月兒童是否安全有效。

重要安全資訊

假如您對dupilumab或DUPIXENT[™]的任何成分過敏，請勿使用。

請查閱所有重要安全資訊，以及隨附的包含患者資訊的完整處方說明[資料夾內]。

您可以看到並 感受到的結果...

在兩個為期16週的成年人臨床試驗中：

有約4倍的人觀察到 皮膚改善或幾乎改善

使用DUPIXENT的患者中，有37%的人觀察到皮膚改善或幾乎改善 vs 未使用DUPIXENT(安慰劑)的患者中，有9%的人觀察到皮膚改善或幾乎改善

顯著減少搔癢感的比例 增加了三倍以上

使用DUPIXENT的患者中，有38%的人感受到搔癢緩解 vs 未使用DUPIXENT(安慰劑)的患者中，有11%的人感受到搔癢緩解

長期安全紀錄

針對成人約五年的安全性 研究結果

針對成年人的長期使用安全性的延伸試驗研究顯示，其安全性結果與最初的臨床試驗一致。

最常見的副作用包括：注射部位反應、眼部問題(包括眼睛和眼瞼發炎、泛紅、腫脹、痕癢、眼部感染、眼乾、視力模糊)、口腔或嘴唇上出現唇瘡，以及特定白血球數量過高(嗜酸性白血球血症)。



請掃描二維碼，查看更多
DUPIXENT在不同年齡組的結果。



KATHY
實際病例

重要安全資訊(續)

在使用DUPIXENT之前，請告訴您的醫療保健提供者有關您的所有醫療狀況，包括您是否有眼疾、患有寄生蟲(蠕蟲)感染、有計劃接種任何疫苗。在接受DUPIXENT療程之前或治療期間，請勿接種「活性疫苗」。

請查閱所有重要安全資訊，以及隨附的包含患者資訊的完整處方說明[資料夾內]。


TYLER
實際病例

DUPIXENT myway

每一步都與您同行

當您被開立DUPIXENT處方後，DUPIXENT MyWay® 患者支持計劃將協助解答您在使用DUPIXENT時可能產生的任何問題。請記住，如果您對您的濕疹或治療計劃有任何疑問，您的醫生仍然是您最好的依靠。

註冊DUPIXENT MyWay®並獲得實用的資源，請致電 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)，選擇選項1。



DUPIXENT MyWay® Copay Card可幫助符合資格、擁有商業保險的患者支付DUPIXENT的自付額。符合商業健康保險涵蓋資格的患者，每次領取DUPIXENT® 藥品可能只需支付最多 \$0 的自付額（每位患者每年最高 \$13,000*）。您可以在線上註冊並透過電子郵件獲取您的卡片。有條款和條件限制。

*年度最高支付金額可能會有所變動

重要安全資訊 (續)

在使用DUPIXENT之前，請告訴醫療保健提供者您所有醫療狀況，包括您是否：已懷孕或計劃懷孕。尚不清楚DUPIXENT是否會對您的胎兒造成傷害。為在懷孕期間使用DUPIXENT的婦女設立懷孕登記冊，收集有關您和胎兒的健康資訊。要註冊或獲取更多資訊，請致電1-877-311-8972或瀏覽<https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupilumab/>。正在餵哺母乳或計劃餵哺母乳。尚不清楚DUPIXENT是否會進入母乳。

請查閱所有重要安全資訊，以及隨附的包含患者資訊的完整處方說明[資料夾內]。



重要安全資訊(續)

請告知您的醫療保健提供者您服用的所有藥物，包括處方藥和非處方藥、維他命和草本藥物保健品。

特別是如果您正在口服、局部外用或使用吸入式皮質類固醇藥物，又或患有異位性皮膚炎和哮喘並使用哮喘藥物，請告知您的醫療保健提供者。未經您的醫療保健提供者許可，**請勿**更換或停止服用您的其他藥物，包括皮質類固醇藥物或其他哮喘藥物。這可能會導致這些藥物控制的其他症狀復發。

DUPIXENT可能導致嚴重的副作用，包括：

- **過敏反應。**使用DUPIXENT可能會引起過敏反應，包括皮膚過敏，有時可能十分嚴重。如果您出現以下任何體徵或症狀，請立即停止使用DUPIXENT並告知您的醫療保健提供者，或立即尋求緊急協助：呼吸困難或喘鳴、面部、嘴唇、口腔、舌頭或喉嚨腫脹、昏厥、頭暈、感到頭重腳輕、脈搏加快、發燒、蕁麻疹、皮膚出疹（包括靶心狀皮疹或疼痛的皮下紅色或藍色腫塊）、全身不適、痕癢、淋巴結腫大、噁心或嘔吐、關節痛或胃部痙攣。
- **眼部問題。**如果您有任何新出現或惡化的眼部問題，包括眼痛或視力有變化，例如視力模糊，請告知您的醫療保健提供者。如有需要，您的醫療保健提供者可能會轉介您到眼科醫生處進行眼科檢查。
- **銀屑病。**這種情況可能發生在使用DUPIXENT的異位性皮膚炎患者身上。請告知您的醫療保健提供者有關您皮膚任何新的症狀。您的醫療保健提供者可能會轉介您到皮膚科醫生處進行檢查。
- **關節疼痛。**有些使用DUPIXENT的患者由於關節症狀而難以行走或移動，在某些情況下需要住院治療。如果出現任何新的關節症狀或症狀惡化，請告知您的醫療保健提供者。如果您出現關節症狀，您的醫療保健提供者可能會停用DUPIXENT。

濕疹患者最常見的副作用包括注射部位反應、眼部問題（包括眼睛和眼瞼發炎、泛紅、腫脹、痕癢、眼部感染、眼乾、視力模糊）、口腔或嘴唇上出現唇瘡，以及特定白血球數量過高（嗜酸性白血球血症）。

假如有任何困擾您或持續的副作用，請告知您的醫療保健提供者。這些並不是所有DUPIXENT可能發生的副作用。請致電您的醫生，尋求有關副作用的醫療建議。我們鼓勵您向美國食品及藥物管理局 (FDA) 報告處方藥的負面副作用。瀏覽www.fda.gov/medwatch，或致電1-800-FDA-1088。

請嚴格按照您的醫療保健提供者的處方使用DUPIXENT。這是一種在皮膚下注射的藥物（皮下注射）。您的醫療保健提供者會決定您或您的照顧者是否可以進行DUPIXENT注射。在您或您的照顧者接受醫療保健提供者的培訓之前，**請勿**嘗試準備和注射DUPIXENT。對於12歲及以上的兒童，建議由成人或在成人監督下使用DUPIXENT。對於6個月至12歲以下的兒童，DUPIXENT應該由照顧者給予使用。

請查閱所有重要安全資訊，以及隨附的包含患者資訊的完整處方說明[資料夾內]。