

DUPIXENT[®]
(dupilumab) Inyección
200mg · 300mg

AYUDA A
CONTROLAR
TU ECZEMA
DESDE
ADENTRO

MANTENTE UN PASO ADELANTE DEL ECZEMA CON DUPIXENT

Aprobado por la FDA para edades de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica) moderado a grave no controlado

Paciente real.
Los resultados individuales
pueden variar.



**LUCE TU PIEL
AL MUNDO**

INDICACIONES

DUPIXENT es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado o grave que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas sobre la piel (tópicas) o en casos que no se puedan utilizar terapias tópicas. DUPIXENT se puede usar con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 meses que tienen dermatitis atópica.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

ANTHONY,
PACIENTE REAL



APRENDE A VER LAS SEÑALES

El eczema (dermatitis atópica) moderado a grave no controlado puede ser difícil de manejar. Podrías estar haciendo todo correctamente y aún presentar síntomas. Pero, ¿has considerado todas las opciones? Es posible que desees preguntarle a tu médico acerca de hacer un cambio en tu tratamiento.

¿CUÁNDO DEBES HABLAR CON UN ESPECIALISTA EN ECZEMA? CUANDO TÚ O TU HIJO:

- ▶ TIENEN ECZEMA QUE CONTINÚA REAPARECIENDO
- ▶ TOMAN ESTEROIDES ORALES MÁS DE UNA VEZ AL AÑO
- ▶ TOMAN INMUNOSUPRESORES MÁS DE UNA VEZ AL AÑO
- ▶ OCULTAN SU PIEL



Recuerda que una buena comunicación es el primer paso para sentirte mejor acerca de tu eczema. Escanea el código o [HAZ CLIC AQUÍ](#) para descargar nuestra “Guía de discusión para hablar con tu médico” y comenzar la conversación con tu especialista.

¿SABÍAS QUE...?

- ▶ PUEDES USAR DUPIXENT CON O SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®. Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente: si tiene problemas oculares; si tiene una infección parasitaria (helmintos); si tiene programado recibir algún tipo de vacuna. No debe recibir ninguna “vacuna viva” antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

UNA DIFERENCIA POR DENTRO Y POR FUERA

Cuando los medicamentos tópicos recetados no son suficientes y tus síntomas y brotes continúan reapareciendo, podría ser el momento de considerar un tipo de tratamiento diferente, como un medicamento biológico. Y DUPIXENT es precisamente eso.

DUPIXENT es un tratamiento innovador para el eczema moderado a grave no controlado.

DUPIXENT:

- ▶ ES UN MEDICAMENTO BIOLÓGICO QUE AYUDA A BLOQUEAR UNA FUENTE PRINCIPAL DE INFLAMACIÓN EN EL INTERIOR DE TU CUERPO QUE PUEDE CAUSAR ECZEMA
- ▶ TE AYUDA A MANTENERTE UN PASO ADELANTE DE LOS SÍNTOMAS PARA TENER UNA PIEL CON MENOS LESIONES Y MENOS PICAZÓN
- ▶ TRATA TU ECZEMA DE FORMA CONTINUA, INCLUSO ENTRE BROTES
- ▶ NO ES UN ESTEROIDE NI UN INMUNOSUPRESOR
- ▶ NO SE ADMINISTRA DIARIAMENTE



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente (cont.): si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT puede dañar al feto. Un registro de embarazo para mujeres que toman DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre su salud y la del bebé. Para inscribirse u obtener más información, llame al 1-877-311-8972 o ingrese en <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>; si está amamantando o tiene planes de amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



**A MÁS DE
457,000*
PACIENTES
SE LES HA
RECETADO DUPIXENT**

*Nuevos pacientes adultos y pediátricos (de 6 meses de edad o más) con eczema moderado a grave no controlado.

Datos de la Fuente Nacional de Negocios (National Source of Business, NSOB) de IQVIA hasta diciembre de 2023



**ANTHONY,
PACIENTE REAL**



ESCANEA EL CÓDIGO
O HAZ CLIC AQUÍ
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN SOBRE
CÓMO DUPIXENT
PUEDE AYUDAR

TOMA EL CONTROL RECIBE TU INYECCIÓN CONTRA EL ECZEMA

Muchas personas con eczema moderado a grave tienen un sistema inmunológico excesivamente activo que produce más inflamación debajo de la piel de lo normal.

DUPIXENT ayuda a bloquear una fuente clave de inflamación que podría estar causando tus síntomas de eczema. Actúa de manera continua en el interior para ayudar a controlar el eczema en el exterior. Y no hay que administrarlo todos los días: ¿quién quiere que le recuerden su eczema a diario?

DUPIXENT es un medicamento biológico: los medicamentos biológicos son medicamentos especializados que se utilizan para tratar diversas afecciones, incluidas las enfermedades inflamatorias crónicas como el eczema moderado a grave. Los medicamentos biológicos se procesan en el cuerpo de manera diferente a los medicamentos orales o tópicos. Para que sean eficaces y actúen en el cuerpo correctamente, la mayoría de los medicamentos biológicos son inyectables, debido a su tamaño y a la forma única en que se fabrican.



**JOLIE,
PACIENTE REAL**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Infórmese a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

RESULTADOS SIGNIFICATIVOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS



¿CÓMO SE ORGANIZARON LOS ENSAYOS CLÍNICOS?

DUPIXENT fue bien estudiado en 6 ensayos clínicos con 2,899 pacientes, de edades comprendidas entre los 6 meses y la edad adulta, para evaluar su perfil de seguridad y determinar su eficacia para reducir las lesiones en la piel y la picazón.

Todos los grupos de edad estudiados presentaban eczema moderado y/o grave que no estaba controlado con medicamentos tópicos recetados.

DUPIXENT fue aprobado por primera vez por la FDA en 2017 para tratar a adultos con eczema moderado a grave no controlado.



¿QUÉ MIDIERON LOS ENSAYOS CLÍNICOS?

Los ensayos clínicos midieron la reducción de las lesiones en la piel, la disminución de la picazón y la seguridad de las personas que usaron DUPIXENT en comparación con las que no usaron DUPIXENT. Cada ensayo midió los resultados a las 16 semanas. Un ensayo midió los resultados a las 16 y las 52 semanas (1 año).



¿QUÉ MEDICAMENTOS SE USARON?

Según el ensayo, los participantes recibieron uno de los siguientes tratamientos:

- ▶ DUPIXENT
- ▶ Placebo (un tratamiento que parece real pero no contiene ningún medicamento)
- ▶ DUPIXENT junto con un corticosteroide tópico (CST)
- ▶ Placebo junto con CST

¿SABÍAS QUE...?

- ▶ PUEDES USAR DUPIXENT CON O SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



**TYLER,
PACIENTE REAL**



**CRISTAL,
PACIENTE REAL**

CASI 5 AÑOS DE RESULTADOS DE SEGURIDAD EN ADULTOS...



LOS RESULTADOS DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO PARA ADULTOS EN UN ESTUDIO DE EXTENSIÓN FUERON COHERENTES CON LOS OBSERVADOS EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS ORIGINALES

Los efectos secundarios más comunes observados en los ensayos clínicos fueron: reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, ojo seco, herpes en la boca o en los labios, y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

...Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ESTUDIADO EN 15 ENSAYOS CLÍNICOS (6 EN ECZEMA, 9 EN OTRAS 4 AFECCIONES)



MEDICAMENTO BIOLÓGICO #1 RECETADO PARA EL ECZEMA POR DERMATÓLOGOS Y ALERGÓLOGOS



NO ES UN ESTEROIDE NI UN INMUNOSUPRESOR



NO SE REQUIEREN ANÁLISIS DE SANGRE INICIALES NI DE RUTINA, SEGÚN LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN



PUEDA USARSE CON O SIN CORTICOSTEROIDES TÓPICOS

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

ANTHONY,
PACIENTE REAL

LUCE UNA PIEL CON MENOS LESIONES Y MENOS PICAZÓN

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS: DUPIXENT FRENTE A PLACEBO

DOS ENSAYOS CLÍNICOS POR SEPARADO, DE 16 SEMANAS
DE DURACIÓN, MOSTRARON LO SIGUIENTE:

4 VECES MÁS ADULTOS
PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES
O CASI SIN LESIONES

El 37% frente al 9% que no usó DUPIXENT (placebo)

>3 VECES MÁS ADULTOS
PRESENTARON UNA REDUCCIÓN
SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN

El 38% frente al 11% que no usó DUPIXENT

CASI LA MITAD DE LOS ADULTOS PRESENTARON

UNA PIEL CON $\geq 75\%$ MENOS DE LESIONES

El 48% frente al 13% que no usó DUPIXENT

MUCHOS PRESENTARON

UNA PIEL CON $\geq 90\%$ MENOS DE LESIONES

El 33% frente al 7% que no usó DUPIXENT

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Sobre todo, infórmelo a su proveedor de atención médica si está tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si tiene dermatitis atópica y asma y usa un medicamento para el asma.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.



ESCANEA EL CÓDIGO
O HAZ CLIC AQUÍ
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN SOBRE
LOS RESULTADOS EN
PACIENTES ADULTOS.

ADULTOS (18 AÑOS O MÁS)

LUCE LO QUE ES POSIBLE A LARGO PLAZO

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS: DUPIXENT + CORTICOSTEROIDES
TÓPICOS (CST) FRENTE A CST ÚNICAMENTE

LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DE UN ENSAYO CLÍNICO
QUE ESTUDIÓ DUPIXENT DURANTE 52 SEMANAS MOSTRARON:

UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES A LAS 16 SEMANAS

El 39% que usó DUPIXENT + CST frente al 12% que usó CST únicamente

UNA PIEL CON MENOS LESIONES POR MÁS TIEMPO A LAS 16 Y LAS 52 SEMANAS

El 22% que usó DUPIXENT + CST frente al 7% que usó CST únicamente

ALIVIO RÁPIDO DE LA PICAZÓN EN APENAS 2 SEMANAS

El 18% que usó DUPIXENT + CST frente al 8% que usó CST únicamente

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN A LAS 16 SEMANAS


El 59% que usó DUPIXENT + CST frente al 20% que usó CST únicamente

ALIVIO DURADERO DE LA PICAZÓN A LAS 52 SEMANAS

El 51% que usó DUPIXENT + CST frente al 13% que usó CST únicamente

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No cambie ni interrumpa la administración del corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar con su proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con el corticosteroide u otro medicamento para el asma.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



ADANTE.
PACIENTE REAL

MANTENTE UN PASO ADELANTE CON MENOS LESIONES Y MENOS PICAZÓN

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS: DUPIXENT FRENTE A PLACEBO

LOS ADOLESCENTES PARTICIPARON EN UN ENSAYO CLÍNICO
DE 16 SEMANAS EN EL QUE:

**12 VECES MÁS ADOLESCENTES
PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES
O CASI SIN LESIONES**

El 24% frente al 2% que no usó DUPIXENT (placebo)

**7 VECES MÁS ADOLESCENTES
PRESENTARON ALIVIO DE LA PICAZÓN**

El 37% frente al 5% que no usó DUPIXENT

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede provocar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser fuertes. Deje de usar DUPIXENT e infórmelo a su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, hinchazón del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o calambres en el área del estómago.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

TYLER,
PACIENTE REAL

ADOLESCENTES (DE 12 A 17 AÑOS)

RESULTADOS COMPROBADOS Y UN PERFIL DE SEGURIDAD DEMOSTRADO EN ADOLESCENTES

CONTINUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS:
DUPIXENT FRENTE A PLACEBO

LOS ADOLESCENTES PARTICIPARON EN UN ENSAYO CLÍNICO
DE 16 SEMANAS EN EL QUE:

CASI LA MITAD DE LOS ADOLESCENTES PRESENTARON
UNA PIEL CON $\geq 75\%$ MENOS DE LESIONES

El 42% frente al 8% en los adolescentes que no usaron DUPIXENT

ALGUNOS PRESENTARON INCLUSO
UNA PIEL CON $\geq 90\%$ MENOS DE LESIONES

El 23% frente al 2% que no usó DUPIXENT

► PUEDES USAR DUPIXENT CON O SIN
UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)

RESULTADOS DE SEGURIDAD:

Los resultados de seguridad a largo plazo para los adolescentes que continuaron usando DUPIXENT en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron coherentes con los ensayos clínicos en adultos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (cont.): Problemas oculares. Dígame a su proveedor de atención médica si tiene nuevos problemas oculares o si nota un empeoramiento de los problemas que tenía, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



JOLIE,
PACIENTE REAL

**CALLA,
PACIENTE REAL**



NIÑOS (DE 6 A 11 AÑOS)

RESULTADOS QUE ELLOS PUEDEN SENTIR RESULTADOS QUE ELLOS PUEDEN LUCIR

Cuidar a tu hijo con eczema moderado a grave no controlado puede ser un desafío, especialmente cuando estás tratando constantemente de evitar los factores desencadenantes.

**RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS:
DUPIXENT + CST FRENTE A CST ÚNICAMENTE**

LOS NIÑOS PARTICIPARON EN UN ENSAYO CLÍNICO DE 16 SEMANAS EN EL QUE:

>2 VECES MÁS NIÑOS PRESENTARON UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES

El 30% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 13% que usó CST únicamente
El 39% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 10% que usó CST únicamente

CASI 4.5 VECES MÁS NIÑOS PRESENTARON MENOS PICAZÓN

El 54% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 12% que usó CST únicamente
El 61% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 13% que usó CST únicamente

**TU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA TE DIRÁ CUÁNTO DUPIXENT INYECTAR
Y CON QUÉ FRECUENCIA**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (cont.): **Problemas oculares.** Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un oftalmólogo para que le realicen un examen, si es necesario.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

NIÑOS (DE 6 A 11 AÑOS)

RESULTADOS COMPROBADOS Y UN PERFIL DE SEGURIDAD DEMOSTRADO EN NIÑOS

CONTINUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS:
DUPIXENT + CST FRENTE A CST ÚNICAMENTE

LOS NIÑOS PARTICIPARON EN UN ENSAYO CLÍNICO DE 16 SEMANAS EN EL QUE:

MÁS DE LA MITAD DE LOS NIÑOS PRESENTARON

UNA PIEL CON $\geq 75\%$ MENOS LESIONES

El 75% que usó 300 mg cada 4 semanas + CST frente al 28% que usó CST únicamente
El 75% que usó 200 mg cada 2 semanas + CST frente al 26% que usó CST únicamente

TU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA TE DIRÁ CUÁNTO DUPIXENT INYECTAR
Y CON QUÉ FRECUENCIA

► PUEDES USAR DUPIXENT CON O SIN UN
CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)

RESULTADOS DE SEGURIDAD:

Los resultados de seguridad a largo plazo para los niños que continuaron usando DUPIXENT con o sin CST en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron coherentes con los ensayos clínicos en adultos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (cont.): Dolores en las articulaciones. Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenía.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



BECKETT,
PACIENTE REAL

CAMERON,
PACIENTE REAL

SANA LA PIEL DE TU PEQUEÑO DESDE ADENTRO

DUPIXENT es el único medicamento biológico aprobado por la FDA para el tratamiento del eczema moderado a grave no controlado en niños desde los 6 meses de edad.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS:
DUPIXENT + CST FRENTE A CST ÚNICAMENTE

LOS NIÑOS PEQUEÑOS PARTICIPARON EN UN ENSAYO CLÍNICO
DE 16 SEMANAS EN EL QUE:

**7 VECES MÁS NIÑOS PEQUEÑOS PRESENTARON
UNA PIEL SIN LESIONES O CASI SIN LESIONES**

El 28% que usó DUPIXENT + CST frente al 4% que usó CST únicamente

**5 VECES MÁS NIÑOS PEQUEÑOS
PRESENTARON MENOS PICAZÓN**

El 48% que usó DUPIXENT + CST frente al 9% que usó CST únicamente

LA MITAD DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS PRESENTARON

UNA PIEL CON $\geq 75\%$ MENOS DE LESIONES

El 53% que usó DUPIXENT + CST frente al 11% que usó CST únicamente

► PUEDES USAR DUPIXENT CON O SIN UN
CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)

RESULTADOS DE SEGURIDAD:

Los resultados de seguridad a largo plazo en niños pequeños que continuaron usando DUPIXENT, con o sin CST, en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron coherentes con los ensayos clínicos en adultos. Además, se notificaron la enfermedad de manos, pies y boca, y verrugas. En estos casos notificados, los pacientes continuaron el tratamiento con DUPIXENT.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (cont.): Dolores en las articulaciones. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrolla síntomas en las articulaciones.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

AYUDA A MEJORAR CÓMO TU PIEL SE VE Y SE SIENTE

El eczema puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, origen étnico o género, y puede aparecer de manera diferente en diferentes tipos de piel. En algunos casos, el sarpullido del eczema podría verse rojo, gris, marrón o morado. DUPIXENT ha demostrado una eficacia generalmente constante independientemente de la raza/origen étnico en estudios con adultos.



Paciente real de 4 años en el ensayo clínico.† Los resultados individuales pueden variar.



Paciente adulto real.*



Paciente real de 6 años de edad en el ensayo clínico.† Los resultados individuales pueden variar.

*Este paciente adulto fue un paciente real tratado con DUPIXENT. No es un paciente de los ensayos clínicos. La puntuación fue designada por el médico tratante. Al ser un paciente del mundo real, otros factores pueden haber influido en los resultados de su tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.

† A todos los pacientes se les recetaron corticosteroides tópicos (CST) de potencia baja o media según el programa del ensayo clínico.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Los efectos secundarios más comunes en pacientes con eczema incluyen: Reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, ojo seco, herpes en la boca o en los labios, y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

DOSIFICACIÓN DE DUPIXENT® (dupilumab):

	PESO CORPORAL	DOSIS DE CARGA INICIAL	DOSIFICACIÓN POSTERIOR
ADULTOS DE 18 AÑOS O MÁS	Cualquier peso	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg; cada 2 semanas
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 17 AÑOS DE EDAD	132 lb o más	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg; cada 2 semanas
	66 lb a menos de 132 lb	400 mg (dos inyecciones de 200 mg)	200 mg; cada 2 semanas
	33 lb a menos de 66 lb	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg; cada 4 semanas
	PESO CORPORAL	DOSIFICACIÓN INICIAL* Y POSTERIOR	
NIÑOS PEQUEÑOS DE 6 MESES A 5 AÑOS DE EDAD	33 lb a menos de 66 lb	300 mg; cada 4 semanas	
	11 lb a menos de 33 lb	200 mg; cada 4 semanas	

DUPIXENT está disponible en forma de pluma precargada o jeringa precargada.

Tu médico te dirá cuánto DUPIXENT inyectar y con qué frecuencia, después de que recibas la capacitación adecuada. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Se debe alternar el lugar de la inyección cada vez que se administre DUPIXENT.



Pluma precargada: disponible en dosis de 200 mg y 300 mg para pacientes de 2 años o más



ESCANEA EL CÓDIGO O HAZ CLIC AQUÍ PARA VER LOS VIDEOS DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE CÓMO ADMINISTRAR DUPIXENT



Jeringa precargada: disponible en dosis de 200 mg y 300 mg para pacientes de 6 meses o más

*No se recomienda una dosis de carga para niños pequeños.

DUPIXENT puede ser administrado por un médico en el consultorio o por un cuidador en tu hogar:

- ▶ en niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador debe administrar DUPIXENT
- ▶ en adolescentes de 12 a 17 años, DUPIXENT debe ser administrado por o bajo la supervisión de un adulto

TU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA DECIDIRÁ SI TÚ O TU CUIDADOR PUEDEN INYECTAR DUPIXENT.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

DUPIXENT Y TÚ

UNA GUÍA DE DISCUSIÓN PARA HABLAR CON TU MÉDICO PERSONALIZADA

Ya sea que estés comenzando el recorrido de tu tratamiento o buscando otra forma de tratar tu eczema moderado a grave no controlado, la siguiente lista de verificación es tanto para pacientes como para cuidadores. Considera esta guía como el inicio de una conversación que puedes continuar con tu especialista en eczema para ayudar a determinar si DUPIXENT podría ser adecuado para ti o para tu ser querido. Elige todas las opciones que correspondan.

¿Eres paciente o cuidador?

- Paciente Cuidador

¿Cuáles son tus objetivos de tratamiento o los de tu ser querido?

- Una piel con menos lesiones Alivio de la picazón

¿Por cuánto tiempo tú o tu ser querido han tenido eczema moderado a grave?

- 0-2 años 2-5 años 5-10 años Más de 10 años

¿Qué tratamientos han sido recetados o utilizados para tu eczema o el de tu ser querido?

- Esteroides tópicos Medicamentos biológicos Ninguno
 Fototerapia Productos de venta libre
 Esteroides orales Otros _____

Describe los síntomas de tu eczema o el de tu ser querido.

GRAVEDAD DE LA ERUPCIÓN CUTÁNEA

- Ninguna Leve Moderada Severa

INTENSIDAD DE LA PICAZÓN

- Ninguna Leve Moderada Severa

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Utilice DUPIXENT exactamente como se lo recetó su proveedor de atención médica. Es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Su proveedor de atención médica decidirá si usted o su cuidador puede inyectar DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

¿Con qué frecuencia se presentan los siguientes síntomas?

PICAZÓN

- Nunca Rara vez Ocasionalmente Frecuentemente

PIEL INFLAMADA Y DESCOLORIDA

- Nunca Rara vez Ocasionalmente Frecuentemente

ZONAS DE LA PIEL ENGROSADAS Y ENDURECIDAS

- Nunca Rara vez Ocasionalmente Frecuentemente

¿Con qué frecuencia se presentan los brotes...

- Cada unos pocos meses Semanalmente
 Mensualmente Diariamente

...y durante cuánto tiempo?

- 1-5 días 5-10 días 10-15 días Más de 15 días

¿Dónde se presentan los síntomas de tu eczema o el de tu ser querido?

- Cuello Pecho Estómago Parte delantera de las rodillas
 Cara Codos Pies Parte posterior de las rodillas
 Manos Tobillos Cuero cabelludo Otro lugar _____

Describe cualquier impacto adicional que el hecho de vivir con eczema haya tenido en ti o en tu ser querido.



Ahora que has terminado, simplemente toma una foto para compartirla con tu especialista en eczema en tu próxima cita.

DUPIXENT myway

CONTIGO EN CADA PASO DEL CAMINO

Una vez que te hayan recetado DUPIXENT, el programa de apoyo al paciente DUPIXENT MyWay® está aquí para ayudarte a responder las preguntas que puedas tener sobre DUPIXENT. Ten en cuenta que tu médico continúa siendo el mejor recurso para ti si tienes alguna pregunta sobre tu eczema o tu programa de tratamiento.

Para inscribirte en DUPIXENT MyWay® y acceder a recursos útiles, llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936) y selecciona la opción 1.



NO ESTÁS SOLO

Es importante saber que DUPIXENT MyWay® ayuda a adultos y niños de 6 meses o más que están iniciando un tratamiento con DUPIXENT o que ya están en tratamiento.



Una vez inscrito en el programa, y mientras se confirman los beneficios de tu seguro para DUPIXENT, recibirás una llamada de bienvenida de tu **Administrador de Casos**, quien te informará sobre el apoyo disponible a través de DUPIXENT MyWay. Además, tu **Administrador de Casos** puede ofrecerte información y apoyo para ayudarte a comenzar y mantenerte en camino con tu tratamiento.



Tu **Administrador de Casos** bilingüe de DUPIXENT MyWay puede responder preguntas sobre DUPIXENT, coordinar capacitación complementaria para las inyecciones y ayudarte a comenzar y mantenerte en el camino correcto.



Con la aplicación de DUPIXENT MyWay Patient App, las personas como tú pueden obtener acceso a herramientas que te ayudarán a comenzar y mantenerte en camino con tu tratamiento. Comunícate con tu **Administrador de Casos** para obtener una invitación con instrucciones sobre cómo obtener la aplicación.



El **Programa de Mentores** de DUPIXENT MyWay te brinda la oportunidad de hablar con otros pacientes y cuidadores de DUPIXENT para escuchar sus experiencias.



ESCANEA EL CÓDIGO
O **HAZ CLIC AQUÍ** PARA
OBTENER INFORMACIÓN
SOBRE RECURSOS ADICIONALES
DE DUPIXENT MyWay.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No intente preparar ni inyectar DUPIXENT hasta que su proveedor de atención médica le haya brindado capacitación a usted o su cuidador. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. En niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

DUPIXENT myway

¿NECESITAS AYUDA PARA EL PAGO?

El Programa de Tarjeta de Copago de **DUPIXENT MyWay** podría ayudar a reducir los gastos de bolsillo de **DUPIXENT**. Los pacientes elegibles podrían pagar tan solo \$0* por abastecimiento de cada receta de **DUPIXENT** (máximo de \$13,000 por paciente, por año calendario).*

UN COPAGO TAN BAJO COMO \$0* PODRÍA ESTAR DISPONIBLE SI:

- ▶ Tienes seguro médico comercial
- ▶ Tienes una receta de **DUPIXENT** para una afección aprobada por la FDA
- ▶ Resides en uno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- ▶ Eres un paciente o cuidador de 18 años o más

La aprobación no está garantizada. El programa tiene un máximo anual de \$13,000. **NO ES UN SEGURO. No es válido para recetas pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluidos los programas estatales de asistencia farmacéutica. Este programa no es válido donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o esté restringido. **DUPIXENT MyWay** se reserva el derecho de rescindir, revocar, terminar o enmendar esta oferta, elegibilidad y términos de uso en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier tipo de ahorro proporcionado por el programa puede variar según los costos de bolsillo de los pacientes. El programa tiene como fin ayudar a los pacientes a afrontar el costo de **DUPIXENT**. Los pacientes podrían tener planes de seguro que intentan diluir el impacto de la asistencia disponible bajo el programa. En esas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Se aplican términos y condiciones adicionales.*

OTRAS OPCIONES DE APOYO

A través del Programa de Asistencia al Paciente, los pacientes elegibles que no tienen seguro o que no están asegurados por su proveedor de seguros podrían recibir **DUPIXENT** sin cargo si cumplen con ciertos requisitos.

Para cumplir con los requisitos, se deberá tener al menos 18 años de edad o más, ser residente de uno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y demostrar una necesidad financiera.

Llama a **DUPIXENT MyWay® al 1-844-387-4936 para obtener información completa sobre el programa y los criterios de elegibilidad.**



**BAILEY,
PACIENTE REAL**

DUPIXENT 
(dupilumab) Inyección
200mg · 300mg

AYUDA A CONTROLAR TU ECZEMA DESDE ADENTRO

PREGÚNTALE A TU ESPECIALISTA
EN ECZEMA SOBRE DUPIXENT
Y VISITA [DUPIXENT.COM/ES](https://www.dupixent.com/es)
O LLAMA AL 1-844-DUPIXENT
(1-844-387-4936)



ESCANEA EL CÓDIGO
O HAZ CLIC AQUÍ
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE DUPIXENT



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de **DUPIXENT**[®].

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

sanofi | **REGENERON**[®]

© 2024 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
DUPIXENT[®] y DUPIXENT MyWay[®] son marcas registradas de Sanofi Biotechnology.
US.DUP.24.02.0130 04/24