DUPIXENT® (dupilumab) Injection 300mg

ES HORA DE HABLAR CON TU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE TUS PÓLIPOS NASALES

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta médica que se usa junto con otros medicamentos para el tratamiento de mantenimiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) en adultos y niños mayores de 12 años cuya enfermedad no está controlada.

Vivir con pólipos nasales puede ser difícil. DUPIXENT es el primer biológico aprobado por la FDA en RSCcPN y no es un inmunosupresor ni un esteroide. Habla con tu proveedor de atención médica sobre cómo DUPIXENT puede ayudarte a controlar tus síntomas.

1 COMPARTE TUS SÍNTOMAS

¿Con qué frecuencia afectan estos síntomas tu vida diaria?

Congestión nasal

☐ Nunca ☐ Todos los días ☐ Todas las semanas ☐ Todos los meses ☐ Otro: _____

Fatiga

☐ Nunca ☐ Todos los días ☐ Todas las semanas ☐ Todos los meses ☐ Otro: _____

Dolor/presión facial

☐ Nunca ☐ Todos los días ☐ Todas las semanas ☐ Todos los meses ☐ Otro: _____

Dificultad para conciliar el sueño

☐ Nunca ☐ Todos los días ☐ Todas las semanas ☐ Todos los meses ☐ Otro: _____

¿Se ha visto afectado tu sentido del olfato?

☐ Sí ☐ No

INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta médica que se usa junto con otros medicamentos para el tratamiento de mantenimiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) en adultos y niños mayores de 12 años cuya enfermedad no está controlada. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 12 años que tengan RSCcPN.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No utilices este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT.

Consulta a lo largo de este documento el resto de la Información importante de seguridad de DUPIXENT.
Por favor consulta la Información de Prescripción completa adjunta, incluida la Información para el Paciente.

DUPIXENT® (dupilumab) Injection 300mg

¿Tienes alguna de estas afecciones?

- ☐ Asma no controlada de moderada a grave
- ☐ Eczema no controlado de moderado a grave (dermatitis atópica)
- ☐ Esofagitis eosinofílica (EoE)



Pregúntale a tu proveedor de atención médica:
¿TENGO PÓLIPOS NASALES NO CONTROLADOS?

2 TRATAMIENTOS ACTUALES

Si tienes problemas para controlar los síntomas, habla con tu proveedor de atención médica sobre tus opciones de tratamiento para ver si hay una alternativa más adecuada para ti.

¿Cuál de estos tratamientos usas actualmente para controlar tus síntomas?

- ☐ Antibióticos
- ☐ Enjuagues salinos
- ☐ Esteroides nasales
- ☐ Esteroides orales



Pregúntale a tu proveedor de atención médica:
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DUPIXENT DE MIS OTROS TRATAMIENTOS?

¿Cuántas veces te han recetado esteroides orales en el último año?

- ☐ 0 veces
- ☐ 1 a 2 veces
- ☐ 3 a 4 veces
- ☐ 4 o más veces

¿Cuántas veces usas un spray nasal de esteroides?

- ☐ Nunca
- ☐ Todos los días
- ☐ Otro: _____

¿Cuántas veces te han operado de pólipos nasales?

- ☐ 0 veces
- ☐ 1 a 2 veces
- ☐ 3 a 4 veces
- ☐ 4 o más veces

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- si tienes problemas oculares.
- si tienes una infección parasitaria (helminto).
- si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una "vacuna viva" justo antes y durante el tratamiento con DUPIXENT.

Consulta a lo largo de este documento el resto de la Información importante de seguridad de DUPIXENT.
Por favor consulta la Información de Prescripción completa adjunta, incluida la Información para el Paciente.

DUPIXENT® (dupilumab) Injection 300mg

3 VIVIR CON PÓLIPOS NASALES

Describe el impacto emocional de vivir con tus síntomas de RSCcPN:

¿Qué actividades cotidianas te gustaría poder hacer más con menos pólipos nasales?



Pregúntale a tu proveedor de atención médica:
¿CÓMO PUEDO EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON DUPIXENT?

COMIENZA TU JORNADA CON DUPIXENT

Lleva este formulario al consultorio y pregúntale a tu proveedor de atención médica sobre DUPIXENT. Si tienes más preguntas antes de tu cita, puedes llamar al equipo de apoyo de *DUPIXENT MyWay*® al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936), opción1**.

APRENDE SOBRE DUPIXENT

Visita DUPIXENT.com para obtener más información sobre cómo DUPIXENT puede ayudarte a controlar tus síntomas de RSCcPN.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluido lo siguiente (continuación):

- si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
  - Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé.
- si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Consulta a lo largo de este documento el resto de la Información importante de seguridad de DUPIXENT.
Por favor consulta la Información de Prescripción completa adjunta, incluida la Información para el Paciente.

DUPIXENT® (dupilumab) Injection 300mg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si estás usando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si tienes RSCcPN y también tienes asma y usas un medicamento para el asma. **No** cambies ni suspendas tus otros medicamentos, incluido el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma, sin hablar con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por esos medicamentos.

DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas, incluidas reacciones en la piel, que algunas veces pueden ser graves.** Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si presentas alguno de los siguientes signos o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo erupción con aspecto de ojo de buey o dolorosas protuberancias rojas o azules bajo la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.
- **Problemas oculares.** Infórmale a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes problemas oculares nuevos o si notas un empeoramiento de los problemas que tenías, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Tu proveedor de atención médica puede referirte a un oftalmólogo para que te realicen un examen, si es necesario.
- **Inflamación de los vasos sanguíneos.** En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un corticosteroide por vía oral que se suspende o se reduce su dosis. Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta: erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aire que empeora, orina de color oscuro o marrón, fiebre persistente, o sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas.
- **Molestias y dolor en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma en las articulaciones nuevo o que empeore. Tu proveedor de atención médica podría interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

Los efectos secundarios más frecuentes en pacientes con RSCcPN incluyen reacciones en el lugar de la inyección; problemas oculares, como inflamación de ojos y párpados, enrojecimiento, hinchazón, picazón, infección ocular y visión borrosa; recuento elevado de determinados glóbulos blancos (eosinofilia); problemas estomacales (gastritis); dolor articular (artralgias); problemas para dormir (insomnio); y dolor en los dientes.

Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Usa DUPIXENT exactamente como te lo recetó tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. **No** intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años de edad o más, se recomienda que DUPIXENT sea administrado por un adulto o bajo su supervisión.

Por favor consulta la Información de Prescripción completa adjunta, incluida la Información para el Paciente.

sanofi | REGENERON®

DUPIXENT® es una marca registrada de Sanofi Biotechnology.
© 2026 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
US.DUP.26.02.0160 10/26