

DUPIXENT[®]
(dupilumab) Injection
200mg · 300mg

**DUPIXENT TE AYUDA
A SENTIR
TU PIEL SANAR
Y VER LA DIFERENCIA**

APROBADO POR LA FDA PARA NIÑOS DE 6 MESES O MÁS



Paciente real. Los resultados individuales pueden variar.

**EL BIOLÓGICO MÁS RECETADO PARA EL ECZEMA
MODERADO A GRAVE**

INDICACIONES

DUPIXENT es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado a grave, que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas que se aplican sobre la piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan usar terapias tópicas. DUPIXENT puede utilizarse con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 meses que tienen DA.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([Inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([Inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

¿CUÁNDO ES MOMENTO DE REPENSAR TU TRATAMIENTO PARA EL ECZEMA?

El eczema puede ser un desafío, incluso cuando ya estás siguiendo los consejos de tu médico y usando cremas y ungüentos tópicos recetados (Rx) para controlarlo. Es posible que aún tengas que lidiar con erupciones cutáneas secas y con picazón, y con brotes continuos. Es una situación que enfrentan muchas personas con eczema moderado a grave, porque a veces los tratamientos tópicos recetados no son suficientes. Las erupciones con picazón siguen reapareciendo debido en parte a la inflamación debajo de la superficie de la piel. Esta inflamación es causada por un sistema inmunitario hiperactivo.

Tal vez sea hora de pedirle a tu médico un tratamiento que funcione de manera diferente.

HABLA CON UN ESPECIALISTA EN ECZEMA CUANDO TÚ O TU HIJO:

- ▶ CONTINUÁN USANDO CREMAS Y UNGÜENTOS TÓPICOS RECETADOS (Rx) QUE NO ESTÁN CONTROLANDO EL ECZEMA.
- ▶ CON FRECUENCIA TIENEN PIEL CON PICAZÓN, INCÓMODA Y BROTES.
- ▶ TOMAN CORTICOSTEROIDES ORALES O INMUNOSUPRESORES MÁS DE UNA VEZ AL AÑO.
- ▶ OCULTAN SU PIEL DE LOS DEMÁS.



ESCANEA AQUÍ PARA PREPARARTE PARA UNA CONVERSACIÓN CON TU MÉDICO



KATE,
PACIENTE REAL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

LA INFLAMACIÓN EN EL INTERIOR PUEDE CAUSAR ECZEMA EN EL EXTERIOR

Es posible que estés tratando tu eczema moderado a grave con solo cremas y ungüentos tópicos recetados. ¿Pero es suficiente si las erupciones con picazón continúan reapareciendo?

Aunque el eczema aparece en la piel, los brotes y la picazón irritante se deben en parte a la inflamación debajo de la piel. **Por eso vale la pena explorar un tratamiento que actúe desde dentro, como DUPIXENT.**

Si tienes eczema, incluso el roce más simple puede resultar incómodo. Las interacciones cotidianas, desde los apretones de manos hasta los abrazos, pueden ser duras para tu piel con erupciones cutáneas.

DUPIXENT puede ayudarte a sentir la sanación y ver la diferencia con menos picazón y una piel más limpia.



CAMERON,
PACIENTE REAL

DUPIXENT® (dupilumab) ACTÚA CONTINUAMENTE PARA:

- ▶ AYUDAR A BLOQUEAR UNA FUENTE CLAVE DE LA INFLAMACIÓN DENTRO DEL CUERPO QUE PUEDE CAUSAR EL ECZEMA.
- ▶ AYUDARTE A MANTENERTE UN PASO ADELANTE DEL ECZEMA CON MENOS PICAZÓN Y UNA PIEL MÁS LIMPIA.
- ▶ TRATAR EL ECZEMA, INCLUSO ENTRE BROTES.

¿SABÍAS QUE...? DUPIXENT:

- ▶ NO ES UN CORTICOSTEROIDE NI UN INMUNODEPRESOR.
- ▶ NO SE TOMA A DIARIO.
- ▶ PUEDE TOMARSE CON O SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente: si tiene problemas oculares; si tiene una infección parasitaria (helmintos); si tiene programado recibir algún tipo de vacuna. No debe recibir ninguna “vacuna viva” antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

CONSIDERA UN ENFOQUE DIFERENTE

DUPIXENT es un medicamento biológico. Los medicamentos biológicos son medicamentos especializados que se usan para tratar diversas afecciones, incluidas las enfermedades inflamatorias crónicas como el eczema moderado a grave.

Los medicamentos biológicos se procesan en el cuerpo de manera diferente a los medicamentos orales o tópicos. Para que sean eficaces y funcionen correctamente, la mayoría de los medicamentos biológicos son inyectables.

Si has tenido dificultades para controlar tu eczema usando solamente medicamentos tópicos recetados, puede que sea el momento de considerar un medicamento biológico como DUPIXENT. Este ayuda a bloquear una fuente clave de la inflamación debajo de la piel.

DUPIXENT puede ayudarte a sanar y ver la diferencia con menos picazón y una piel más limpia.



TYLER,
PACIENTE REAL

MÁS DE **[830,105*]** PACIENTES
RECETADOS CON DUPIXENT

*Pacientes adultos y pediátricos nuevos (6 meses o más) con eczema moderado a grave no controlado. Datos de la Fuente Nacional de Negocios (NSOB, por sus siglas en inglés) de IQVIA hasta **[marzo de 2026]**.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente (continuación): si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT puede dañar al feto. Un registro de embarazo para mujeres que toman DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre su salud y la del bebé; si está amamantando o tiene planes de amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.



RACHEL,
PACIENTE REAL

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés y español](#)) y la Información para el paciente ([inglés y español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

KENNY,
PACIENTE REAL

¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO?

Antes de que un medicamento esté disponible para el público general, su eficacia y seguridad deben demostrarse mediante ensayos clínicos controlados.* Después de completar estos ensayos, la información se envía a la FDA para su revisión. La FDA revisa los resultados del ensayo y toma una decisión sobre si aprueba o no el medicamento.

¿QUIÉNES FUERON INCLUIDOS EN LOS ENSAYOS?

DUPIXENT se estudió en 7 ensayos clínicos sobre eczema con 3032 pacientes, mayores de 6 meses.

Todos los grupos de edad tenían eczema moderado y/o grave que no estaba bien controlado.

¿QUÉ MIDIERON LOS ENSAYOS?

Los ensayos midieron la limpieza de la piel, la reducción de la picazón y la seguridad entre las personas que usaron DUPIXENT en comparación con las que no lo usaron. Cada ensayo midió los resultados a los 4 meses (16 semanas). Uno de los ensayos también midió los resultados a 1 año (52 semanas).

¿QUÉ MEDICAMENTOS SE UTILIZARON?

Dependiendo del ensayo, los participantes recibieron uno de los siguientes:

- ▶ DUPIXENT.
- ▶ Placebo (un tratamiento que parece real pero no contiene ningún medicamento).
- ▶ DUPIXENT con un corticosteroide tópico (CST).
- ▶ Placebo con CST.

*Los ensayos controlados tienen protocolos específicos que el médico y el paciente deben seguir. Existen otros tipos de ensayos clínicos, pero se requieren ensayos controlados para la aprobación por parte de la FDA.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

RESULTADOS DE SEGURIDAD A 5 AÑOS EN ADULTOS



LOS RESULTADOS DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO EN ADULTOS EN UN ESTUDIO DE EXTENSIÓN FUERON CONSISTENTES CON LOS OBSERVADOS EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS ORIGINALES

Los efectos secundarios observados con más frecuencia en los ensayos clínicos fueron: reacciones en el lugar de la inyección, problemas oculares, que incluyen inflamación de los ojos y los párpados, enrojecimiento, hinchazón, picazón, infección ocular, ojo seco y visión borrosa, herpes en la boca o en los labios y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



APROBADO POR LA FDA PARA TRATAR EDADES DE 6 MESES EN ADELANTE.



CON ESTUDIOS EN 19 ENSAYOS CLÍNICOS: 7 ESPECÍFICAMENTE EN ECZEMA, 12 EN 5 OTRAS AFECCIONES.



SEGÚN LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN, NO SE REQUIEREN ANÁLISIS DE SANGRE INICIALES NI DE RUTINA.



NO ES UN CORTICOSTEROIDE NI UN INMUNOSUPRESOR.



EL MEDICAMENTO BIOLÓGICO #1 RECETADO POR DERMATÓLOGOS Y ALERGÓLOGOS PARA EL ECZEMA.

ESCUCHA A PACIENTES REALES

DUPIXENT ha ayudado a muchos de nuestros embajadores a sentir que la piel sana y ver la diferencia. [Escanea para escuchar sus historias.](#)

Los resultados individuales pueden variar.



ANTHONY,
PACIENTE REAL DESDE 2017

“Hoy finalmente siento que tengo cierto control sobre algo que estuvo fuera de control durante demasiado tiempo”.



RACHEL,
PACIENTE REAL DESDE 2017

“Estando en tratamiento con Dupixent... Me preocupo menos por mi piel. El eczema no es lo primero en lo que pienso cuando salgo, y eso me hace sentir muy bien”.



ESCUCHA A MÁS PACIENTES EMBAJADORES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

DUPIXENT TE AYUDA SIENTE LA CURACIÓN Y NOTA LA DIFERENCIA

El eczema puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, origen étnico o género, y puede verse diferente en distintos tonos de piel. En algunos casos, las erupciones pueden verse rojas, grises, marrones o moradas.

En los ensayos clínicos en adultos, la eficacia de DUPIXENT ha sido generalmente consistente, independientemente del grupo racial o el origen étnico.

PACIENTES REALES DE DUPIXENT

Los resultados individuales pueden variar.

ANTES DEL TRATAMIENTO



DESPUÉS DE CUATRO MESES DE TRATAMIENTO

Paciente adulto de la vida real. No es un paciente de un ensayo clínico.[†]

ANTES DEL TRATAMIENTO



DESPUÉS DE CUATRO MESES DE TRATAMIENTO

Paciente real de 4 años de un ensayo clínico.*

ANTES DEL TRATAMIENTO



DESPUÉS DE CUATRO MESES DE TRATAMIENTO

Paciente real de 10 años de un ensayo clínico.*



ADULTOS



NIÑOS

ESCANEA PARA VER MÁS
RESULTADOS EN LA GALERÍA
DE "ANTES Y DESPUÉS"

*A todos los pacientes se les recetaron corticosteroides tópicos (CST) de potencia baja o media conforme al programa del ensayo clínico.

[†]Dado que se trató de un paciente del mundo real, otros factores pueden haber influido en los resultados del tratamiento (como el uso de otros tratamientos).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Sobre todo, infórmele a su proveedor de atención médica si está tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados; o si tiene DA y asma y usa un medicamento para el asma.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

PIEL NOTABLEMENTE MÁS LIMPIA Y ALIVIO DE LA PICAZÓN

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT frente a PLACEBO

DOS ENSAYOS CLÍNICOS INDEPENDIENTES DE 4 MESES DE DURACIÓN REALIZADOS CON ADULTOS DEMOSTRARON LO SIGUIENTE:

APROX
4 VECES

SE OBSERVÓ PIEL LIMPIA O
CASI LIMPIA

37% frente al 9% que no recibieron DUPIXENT (placebo)

CASI LA MITAD NOTARON

AL MENOS
75%

LA PIEL MÁS LIMPIA

48% frente al 13% que no recibió DUPIXENT

MUCHOS ADULTOS NOTARON

AL MENOS
90%

LA PIEL MÁS LIMPIA

33% frente a 7% sin tratamiento con DUPIXENT

>3 VECES

PRESENTARON UNA REDUCCIÓN
SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN

38% frente a 11% sin tratamiento con DUPIXENT



ANTHONY,
PACIENTE REAL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No cambie ni interrumpa la administración del corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar con su proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con esos medicamentos.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.



KENNY,
PACIENTE REAL

RESULTADOS A LARGO PLAZO CON DUPIXENT[®] (dupilumab)

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT + CORTICOSTEROIDES TÓPICOS (CST)
frente a CST ÚNICAMENTE

LOS ADULTOS QUE PARTICIPARON EN UN ENSAYO DE 1 AÑO DE DURACIÓN NOTARON:

PIEL MÁS LIMPIA Y DURANTE MÁS TIEMPO

A los 4 meses: 39% con DUPIXENT + CST frente al 12% con
CST únicamente

Tanto a 4 meses como a 1 año: 22% con DUPIXENT + CST
frente al 7% con CST únicamente

ALIVIO DURADERO DE LA PICAZÓN

A los 4 meses: 59% con DUPIXENT + CST frente al 20%
con CST únicamente

A 1 año: 51% con DUPIXENT + CST frente al 13% con
CST únicamente

ALIVIO RÁPIDO DE LA PICAZÓN DESPUÉS DE LA PRIMERA DOSIS

A las 2 semanas: 18% con DUPIXENT + CST frente al 8%
con CST únicamente

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas, incluidas reacciones cutáneas, que algunas veces pueden ser fuertes. Deje de usar DUPIXENT e infórmele a su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, hinchazón del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo sarpullido que parece una diana o protuberancias rojas o azules dolorosas debajo de la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

PIEL MÁS LIMPIA Y MENOS PICAZÓN PARA LOS ADOLESCENTES

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT frente a PLACEBO

LOS ADOLESCENTES PARTICIPARON EN UN ENSAYO CLÍNICO DE 4 MESES DE DURACIÓN Y NOTARON:

PIEL SIGNIFICATIVAMENTE MÁS LIMPIA

12 VECES

NOTARON UNA PIEL LIMPIA O
CASI LIMPIA

24% frente a 2% sin tratamiento con DUPIXENT (placebo)

CASI LA MITAD NOTÓ

AL MENOS

75%

LA PIEL MÁS LIMPIA

42% frente a 8% con DUPIXENT

ALGUNOS NOTARON

AL MENOS

90%

LA PIEL MÁS LIMPIA

23% frente al 2 % que no recibió DUPIXENT

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN

APROX.
7 VECES

PRESENTARON ALIVIO DE
LA PICAZÓN

37% frente a 5% que no recibió DUPIXENT



OLIVIA,
PACIENTE REAL



**PUEDES USAR DUPIXENT CON O
SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)**

RESULTADOS DE SEGURIDAD A 1 AÑO:

Los resultados de seguridad a largo plazo en adolescentes que continuaron el tratamiento con DUPIXENT en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron consistentes con los ensayos clínicos en adultos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (continuación): **Problemas oculares.** Dígame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene nuevos problemas oculares o si nota un empeoramiento de los problemas que tenía, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un oftalmólogo para que le realicen un examen, si es necesario.

Soriasis. Esto puede ocurrir en personas con dermatitis atópica que reciben DUPIXENT. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en la piel. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un dermatólogo para que le realicen un examen, si es necesario.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

MÁS NIÑOS PRESENTARON ALIVIO

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT + CST frente a CST ÚNICAMENTE

LOS NIÑOS PARTICIPARON EN UN ENSAYO DE 4 MESES DE DURACIÓN Y NOTARON LO SIGUIENTE:

PIEL NOTABLEMENTE MÁS LIMPIA

>2 VECES

NOTARON UNA PIEL LIMPIA O
CASI LIMPIA

Menos de 66 lb: 30% con DUPIXENT + CST frente a 13% con CST únicamente

66 lb o más: 39% con DUPIXENT + CST frente a 10 % con CST únicamente

MÁS DE LA MITAD NOTÓ

AL MENOS
75%

LA PIEL MÁS LIMPIA

Menos de 66 lb: 75% con DUPIXENT + CST frente a 28% con CST únicamente

66 lb o más: 75% con DUPIXENT + CST frente al 26% con CST únicamente

REDUCCIÓN CONSIDERABLE DE LA PICAZÓN

APROX.
4.5 VECES

PRESENTÓ
MENOS PICAZÓN

Menos de 66 lb: 54% con DUPIXENT + CST frente al 12% con CST únicamente

66 lb o más: 61% con DUPIXENT + CST frente al 13% con CST únicamente

La dosificación se basa en la edad y el peso. El médico de tu hijo te dirá cuánta cantidad de DUPIXENT debe administrarse y con qué frecuencia.



**PUEDES USAR DUPIXENT CON O
SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)**

RESULTADOS DE SEGURIDAD A 1 AÑO:

Los resultados de seguridad a largo plazo en niños que continuaron recibiendo DUPIXENT con o sin CST en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron consistentes con los ensayos clínicos en adultos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (continuación): Dolores en las articulaciones. Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenía. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrolla síntomas en las articulaciones.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

INCLUSO TU HIJO MÁS PEQUEÑO PUEDE SENTIR LA CURACIÓN

RESULTADOS DEL ENSAYO: DUPIXENT + CST frente a CST ÚNICAMENTE

LOS NIÑOS PEQUEÑOS QUE PARTICIPARON EN UN ENSAYO DE 4 MESES DE DURACIÓN, NOTARON:

PIEL NOTABLEMENTE MÁS LIMPIA

7 VECES

NOTARON UNA PIEL LIMPIA O
CASI LIMPIA

28% con DUPIXENT + CST frente al 4% con CST únicamente

MÁS DE LA MITAD NOTÓ

AL MENOS
75%

LA PIEL MÁS LIMPIA

53% con DUPIXENT + CST frente al 11% con CST únicamente

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PICAZÓN

>5 VECES

PRESENTÓ
MENOS PICAZÓN

48% con DUPIXENT + CST frente al 9% con CST únicamente



CAMERON,
PACIENTE REAL



PUEDES USAR DUPIXENT CON O
SIN UN CORTICOSTEROIDE TÓPICO (CST)

RESULTADOS DE SEGURIDAD A 1 AÑO:

Los resultados de seguridad a largo plazo en niños pequeños que continuaron recibiendo DUPIXENT con o sin CST en el estudio de extensión pediátrico durante 1 año fueron consistentes con los ensayos clínicos en adultos. Además, se reportaron casos de enfermedad de manos, pies y boca, y verrugas. En estos casos reportados, los pacientes continuaron el tratamiento con DUPIXENT.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Los efectos secundarios más comunes en pacientes con eczema incluyen reacciones en el lugar de la inyección; problemas oculares, que incluyen inflamación de los ojos y los párpados, enrojecimiento, hinchazón, picazón, infección ocular, ojo seco y visión borrosa; herpes en la boca o en los labios; y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

DUPIXENT[®] (dupilumab) Y USTED

TU GUÍA DE CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO

Independientemente de en qué etapa del tratamiento te encuentres tú o tu hijo, esta guía puede ayudarte a organizar tus pensamientos para tener una conversación productiva con tu especialista en eczema. Así que inicia la conversación sobre DUPIXENT como una opción. No dejes pasar la oportunidad de ayudar a que tu piel o la de tu hijo sane.

¿ERES UN PACIENTE O CUIDADOR?

- ☐ Paciente ☐ Cuidador

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS DE TRATAMIENTO O LOS DE TU SER QUERIDO CON DUPIXENT?

- ☐ Piel más limpia ☐ Alivio de la picazón

¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE TÚ O TU SER QUERIDO TIENEN ECZEMA?

- ☐ Entre 0 y 2 años ☐ Entre 2 y 5 años ☐ Entre 5 y 10 años ☐ Más de 10 años

¿QUÉ TRATAMIENTOS SE HAN RECETADO O UTILIZADO PARA CONTROLAR TU ECZEMA O EL DE TU SER QUERIDO?

- ☐ Corticosteroides tópicos ☐ Medicamentos biológicos ☐ Ninguna
- ☐ Fototerapia ☐ Productos de venta libre
- ☐ Corticosteroides orales ☐ Otro _____

DESCRIBE LOS SÍNTOMAS DEL ECZEMA QUE TÚ O UN SER QUERIDO PRESENTAN.

GRAVEDAD DE LA ERUPCIÓN

- ☐ Ninguna ☐ Leve ☐ Moderada ☐ Grave

INTENSIDAD DE LA PICAZÓN

- ☐ Ninguna ☐ Leve ☐ Moderada ☐ Grave

¿CON QUÉ FRECUENCIA APARECEN ESTOS SÍNTOMAS?

PICAZÓN

- ☐ Nunca ☐ Casi nunca ☐ Ocasionalmente ☐ Con frecuencia

PIEL INFLAMADA Y DESCOLORIDA

- ☐ Nunca ☐ Casi nunca ☐ Ocasionalmente ☐ Con frecuencia

PARCHES EN LA PIEL ENGROSADOS Y ENDURECIDOS

- ☐ Nunca ☐ Casi nunca ☐ Ocasionalmente ☐ Con frecuencia

¿CON QUÉ FRECUENCIA OCURREN LOS BROTES...

- ☐ Cada pocos meses ☐ Mensualmente
- ☐ Semanalmente ☐ Diariamente

... Y POR CUÁNTO TIEMPO?

- ☐ Entre 1 y 5 días ☐ Entre 5 y 10 días ☐ Entre 10 y 15 días ☐ Más de 15 días

¿DÓNDE TIENES LOS SÍNTOMAS DEL ECZEMA?

- ☐ Cuello ☐ Pecho ☐ Abdomen ☐ Parte delantera de las rodillas
- ☐ Rostro ☐ Codos ☐ Pies ☐ Parte posterior de las rodillas
- ☐ Manos ☐ Tobillos ☐ Cuero cabelludo ☐ Otro _____

DESCRIBE CUALQUIER OTRO IMPACTO QUE HAYA TENIDO EN TI O EN TU SER QUERIDO EL HECHO DE VIVIR CON ECZEMA.



TOMA UNA FOTO DE TUS RESPUESTAS PARA COMPARTIRLAS CON TU PROPIO MÉDICO, O CON EL DE TU HIJO, EN LA PRÓXIMA CITA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Le recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

CÓMO COLABORAR CON TU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA



PRUEBA ESTOS CONSEJOS PARA TENER UNA CONSULTA PRODUCTIVA CON EL MÉDICO

Tener una conversación abierta con tu equipo de atención médica es el primer paso para trabajar hacia un plan de tratamiento que funcione para ti.

- ▶ NO TENGAS MIEDO DE HABLAR Y DEFENDER TUS PROPIOS INTERESES O LOS DE UN SER QUERIDO.
- ▶ TOMA FOTOGRAFÍAS Y HAZ UN SEGUIMIENTO DE TUS SÍNTOMAS (O DE LOS SÍNTOMAS DE TU SER QUERIDO).
- ▶ PREPARA TUS PREGUNTAS Y TEMAS PARA HABLAR CON LOS ESPECIALISTAS.
- ▶ TOMA NOTAS Y LLÉVALAS A LAS VISITAS CON EL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA.



SOPHIA,
PACIENTE REAL



HERRAMIENTA "ENCUENTRA UN ESPECIALISTA HEALTHGRADES™"



PÁGINA DE RECURSOS PARA CUIDADORES

RECURSOS DISPONIBLES EN DUPIXENT.COM

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Utilice DUPIXENT exactamente como se lo recetó su proveedor de atención médica. Es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Su proveedor de atención médica decidirá si usted o su cuidador puede inyectar DUPIXENT.

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

DOSIFICACIÓN DE DUPIXENT[®] (dupilumab):

	PESO CORPORAL	DOSIS DE CARGA INICIAL	DOSIS POSTERIOR
ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS	Cualquier peso	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg cada 2 semanas
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 17 AÑOS DE EDAD	132 libras o más	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg cada 2 semanas
	66 lb a menos de 132 lb	400 mg (dos inyecciones de 200 mg)	200 mg cada 2 semanas
	33 libras a menos de 66 libras	600 mg (dos inyecciones de 300 mg)	300 mg cada 4 semanas
	PESO CORPORAL	DOSIS INICIAL* Y DOSIS POSTERIOR	
NIÑOS PEQUEÑOS 6 MESES A 5 AÑOS	33 libras a menos de 66 libras	300 mg cada 4 semanas	
	11 libras a menos de 33 libras	200 mg cada 4 semanas	

Tu médico te dirá cuánta cantidad de **DUPIXENT** inyectar y con qué frecuencia.

DUPIXENT ESTÁ DISPONIBLE COMO UNA PLUMA PRECARGADA O UNA JERINGA PRECARGADA.

Tu médico decidirá si tú o un cuidador pueden inyectar DUPIXENT y les brindará la capacitación adecuada. DUPIXENT se administra mediante una inyección debajo de la piel (inyección subcutánea). Recuerda rotar el lugar de la inyección cada vez que tú te administres DUPIXENT.



PLUMA PRECARGADA

disponible en dosis de 200 mg y 300 mg para pacientes de 2 años o más



JERINGA PRECARGADA

disponible en dosis de 200 mg y 300 mg para pacientes de 6 meses o más



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER VIDEOS DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIOS SOBRE CÓMO ADMINISTRAR DUPIXENT

*Para niños pequeños, no se recomienda una dosis de carga inicial.

DUPIXENT PUEDE SER ADMINISTRADO POR UN MÉDICO EN LA CONSULTA O POR UN CUIDADOR EN CASA:

- ▶ En niños de 6 meses a menos de 12 años, DUPIXENT debe ser administrado por un cuidador.
- ▶ En adolescentes de 12 a 17 años, DUPIXENT debe ser administrado o supervisado por un adulto.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No intente preparar ni inyectar DUPIXENT hasta que su proveedor de atención médica le haya brindado capacitación a usted o su cuidador. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. En niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT. Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

DUPIXENT
myway 

EN CADA PASO DEL CAMINO

Una vez que te hayan recetado DUPIXENT, el programa de apoyo al paciente DUPIXENT MyWay está aquí para ayudarte a responder las preguntas que puedas tener sobre DUPIXENT. Ten en cuenta que tu médico sigue siendo el mejor recurso si tienes alguna pregunta sobre tu eczema o tu programa de tratamiento.

Para inscribirte en DUPIXENT MyWay y acceder a recursos útiles, llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936) y selecciona la opción 1.



SOPHIA,
PACIENTE REAL

ESTAMOS CONTIGO

Es importante saber que DUPIXENT MyWay ayuda a los adultos y a los cuidadores de niños que están en tratamiento con DUPIXENT o que están a punto de comenzar.



Una vez que estés inscrito en el programa, y mientras se confirman tus beneficios de seguro para DUPIXENT, recibirás una llamada de bienvenida de tu **gerente de casos**, quien te explicará el apoyo disponible de DUPIXENT MyWay. Además, tu **gerente de casos** puede ofrecerte educación y apoyo para ayudarte a comenzar y mantenerte al día con tu tratamiento.



Tu **gerente de casos de DUPIXENT MyWay** puede responder tus preguntas sobre DUPIXENT, coordinar capacitación adicional sobre cómo aplicar las inyecciones y ayudarte a comenzar el tratamiento y a mantenerte encaminado.



Con la **aplicación para pacientes DUPIXENT MyWay**, personas como tú pueden acceder a herramientas que te ayudarán a iniciar tu tratamiento y a mantenerte encaminado con el mismo. Comunícate con tu **gerente de casos** para recibir una invitación con instrucciones sobre cómo obtener la aplicación.



El **programa de mentores DUPIXENT MyWay** te brinda la oportunidad de hablar con otros pacientes que usan DUPIXENT y con sus cuidadores para conocer sus experiencias.



ESCANEA AQUÍ PARA CONOCER RECURSOS
ADICIONALES DE DUPIXENT MyWay

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.



TU COPAGO PODRÍA SER TAN SOLO \$0*

El programa de tarjeta de copago **DUPIXENT MyWay** puede ayudar a reducir el costo de bolsillo de **DUPIXENT**. Los pacientes elegibles con seguro médico comercial pueden **pagar tan solo \$0*** en copago por cada receta de **DUPIXENT**® (dupilumab). Se aplican términos y condiciones.

PUEDES SER ELEGIBLE SI:

- ▶ Tienes un seguro médico comercial.
- ▶ Tienes una receta de **DUPIXENT** para una afección aprobada por la FDA.
- ▶ Resides en uno de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
- ▶ Eres un paciente o cuidador mayor de 18 años.

[*Sujeto al beneficio máximo del programa por paciente por año calendario. La aprobación no está garantizada. **ESTO NO ES UN SEGURO**. No válido para recetas pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluidos los programas estatales de asistencia farmacéutica. Este programa no es válido en los lugares donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o tenga restricciones. **DUPIXENT MyWay** se reserva el derecho de rescindir, revocar, terminar o enmendar esta oferta, elegibilidad y términos de uso en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier ahorro proporcionado por el programa puede variar según los costos de bolsillo de los pacientes. El programa tiene como fin ayudar a los pacientes a afrontar el costo de **DUPIXENT**. Los pacientes podrían tener planes de seguro que intentan diluir el impacto de la asistencia disponible bajo el programa. En esas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Se aplican términos y condiciones adicionales.]

OTRAS OPCIONES DE APOYO

A través del programa de asistencia para pacientes, los pacientes elegibles que no tengan seguro médico o cuyo seguro no cubra el tratamiento podrían recibir **DUPIXENT** sin costo alguno si cumplen con los requisitos.

Quienes cumplan con los requisitos deben tener al menos 18 años de edad o más, ser residentes de uno de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y demostrar que tienen una necesidad financiera.

Llama a **DUPIXENT MyWay® al 1-844-387-4936 para obtener información completa sobre el programa y los criterios de elegibilidad.**



TYLER,
PACIENTE REAL

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

DUPIXENT[®]
(dupilumab) Injection
200mg • 300mg

**AYUDA
A SANAR
TU PIEL
DESDE
ADENTRO™**

**MÁS DE [830,105*] PACIENTES
RECETADOS CON DUPIXENT**

**LILA,
PACIENTE REAL**



**ESCANEA PARA
OBTENER MÁS
INFORMACIÓN**

*Pacientes adultos y pediátricos nuevos (6 meses o más) con eczema moderado a grave no controlado. Datos de la Fuente Nacional de Negocios (NSOB, por sus siglas en inglés) de IQVIA hasta [marzo de 2026].

**PREGÚNTALE A TU ESPECIALISTA EN ECZEMA SOBRE DUPIXENT
Y VISITA DUPIXENT.COM O LLAMA AL 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT[®].

Consulta la Información de seguridad importante en todo el documento, así como la Información de prescripción completa ([inglés](#) y [español](#)) y la Información para el paciente ([inglés](#) y [español](#)) disponibles en el bolsillo trasero.

sanofi | REGENERON[®]

© 2026 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
DUPIXENT[®] y DUPIXENT MyWay[®] son marcas registradas de
Sanofi Biotechnology. US.DUP.26.05.0054 07/26