DUPIXENT® (dupilumab) Injection
200mg · 300mg

CÓMO HABLAR CON TU MÉDICO ACERCA DE DUPIXENT

Si otros tratamientos tópicos recetados no te brindan el alivio que necesitas, este podría ser el momento de probar otra opción. DUPIXENT® (dupilumab) es un medicamento inyectable de venta con receta que se aplica debajo de la piel (inyección subcutánea), el cual ayuda a tratar tu eczema moderado a grave no controlado (dermatitis atópica). Conversa con tu médico sobre tus respuestas a las siguientes preguntas para ver si DUPIXENT es adecuado para ti.

- Si eres cuidador de un niño (de 6 meses a 11 años) o adolescente (de 12 a 17 años) con eczema, conversen juntos sobre estas preguntas y compartan las respuestas con su proveedor de atención médica.

HERRAMIENTAS PARA HABLAR SOBRE TUS SÍNTOMAS

El eczema puede ser complicado, y eso podría dificultar que los pacientes logren que sus seres queridos y médicos comprendan cómo es vivir con esta afección. Los síntomas podrían ser causados por muchos factores, pueden cambiar con el tiempo y tener un aspecto diferente en el tono de piel de cada persona.

En general, ¿qué tan molestos son tus síntomas? Considera compartir tu respuesta con tu médico.

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10

Nada molestos *Extremadamente molestos*

¿Cómo afecta el eczema a tu piel? _____

_____



El eczema tiene un aspecto diferente en cada persona. Informa a tu médico si tienes partes rojas secas en la piel que te pican y que a veces supuran y se agrietan.



Toma fotos de tu piel durante un brote y compártelas con tu médico para ayudarle a comprender tus síntomas.

TUS OBJETIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE TU ECZEMA

Mi esperanza para este tratamiento es _____

_____

_____

INDICACIONES

DUPIXENT es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado a grave, que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas que se aplican sobre la piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan usar terapias tópicas. DUPIXENT puede utilizarse con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 meses que tienen DA.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE E INDICACIONES

No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®.

Por favor, consulte la Información de Seguridad Importante adicional sobre DUPIXENT de principio a fin.
Por favor, consulte la Información completa de Prescripción adjunta, incluida la Información para el Paciente.

PREGUNTAS PARA HACERLE A TU MÉDICO

DUPIXENT es el primer tratamiento biológico de su tipo que puede ayudar a tratar de manera proactiva los síntomas del eczema desde adentro. Puedes hacerle estas preguntas a tu médico para saber si DUPIXENT es adecuado para ti o para tu hijo/a:

Acerca de DUPIXENT

- ¿Cómo puede DUPIXENT ayudar a mejorar mi picazón y lesiones?
- ¿Cómo actúa DUPIXENT de forma diferente?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de DUPIXENT?

Dosificación

- ¿Cómo se administra DUPIXENT?
- ¿Dónde se inyecta DUPIXENT?
- ¿Cómo puedo capacitarme para dar las inyecciones de DUPIXENT y obtener apoyo para este proceso?

Apoyo

- ¿Qué tipo de apoyo está disponible para ayudarme durante mi tratamiento con DUPIXENT?
- ¿Cómo obtengo un suministro para mi receta para DUPIXENT?
- ¿Puedo obtener más información sobre el costo y la asistencia financiera para DUPIXENT?

Anota otros temas que tú y tus seres queridos quisieran discutir con tu médico: _____

_____

_____

¿Tienes más preguntas?

Puedes obtener asistencia individualizada y gratuita en español e inglés llamando a los Administradores de Casos de *DUPIXENT MyWay*® al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- Si tiene problemas oculares.
- Si tiene una infección parasitaria (helmintos).
- Si tiene programado recibir algún tipo de vacuna. No debe recibir ninguna "vacuna viva" antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.
- Si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT puede dañar al feto.
  - Un registro de embarazo para mujeres que toman DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre su salud y la del bebé.
- Si está amamantando o tiene planes de amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se trasmite a través de la leche materna.

Por favor, consulte la Información de Seguridad Importante adicional sobre DUPIXENT de principio a fin.
Por favor, consulte la Información completa de Prescripción adjunta, incluida la Información para el Paciente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

- **Sobre todo, infórmele a su proveedor de atención médica si** está tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados; o si tiene DA y asma y usa un medicamento para el asma. **No** cambie ni interrumpa la administración del corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar con su proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con esos medicamentos.

DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas, incluidas reacciones cutáneas, que algunas veces pueden ser fuertes.** Deje de usar DUPIXENT e infórmele a su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, hinchazón del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo sarpullido que parece una diana o protuberancias rojas o azules dolorosas debajo de la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.
- **Problemas oculares.** Dígale a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene nuevos problemas oculares o si nota un empeoramiento de los problemas que tenía, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un oftalmólogo para que le realicen un examen, si es necesario.
- **Soriasis.** Esto puede ocurrir en personas con dermatitis atópica que reciben DUPIXENT. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en la piel. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un dermatólogo para que le realicen un examen, si es necesario.
- **Dolores en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenía. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrolla síntomas en las articulaciones.

Los efectos secundarios más comunes en pacientes con eczema incluyen reacciones en el lugar de la inyección; problemas oculares, que incluyen inflamación de los ojos y los párpados, enrojecimiento, hinchazón, picazón, infección ocular, ojo seco y visión borrosa; herpes en la boca o en los labios; y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Le recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

Utilice DUPIXENT exactamente como se lo recetó su proveedor de atención médica. Es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Su proveedor de atención médica decidirá si usted o su cuidador puede inyectar DUPIXENT. **No** intente preparar ni inyectar DUPIXENT hasta que su proveedor de atención médica le haya brindado capacitación a usted o su cuidador. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. En niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT.

Consulte la Información completa de Prescripción adjunta, incluida la Información para el Paciente.

sanofi | REGENERON®

DUPIXENT y DUPIXENT MyWay son marcas registradas de Sanofi o una filial.

© 2026 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.

[TITLE] How to Talk to Your Doctor About DUPIXENT	[TITLE] Cómo hablar con tu médico acerca de DUPIXENT
[INTRO COPY] If other topical prescription treatments aren't giving you the relief you need, it may be time to try another option. DUPIXENT® (dupilumab) is an injectable prescription medicine given under the skin (subcutaneous injection) that helps treat uncontrolled moderate-to-severe eczema (atopic dermatitis). Discuss your answers to the following questions with your doctor to see if DUPIXENT is right for you.	[INTRO COPY] Si otros tratamientos tópicos recetados no te brindan el alivio que necesitas, este podría ser el momento de probar otra opción. DUPIXENT® (dupilumab) es un medicamento inyectable de venta con receta que se aplica debajo de la piel (inyección subcutánea), el cual ayuda a tratar tu eczema moderado a grave no controlado (dermatitis atópica). Conversa con tu médico sobre tus respuestas a las siguientes preguntas para ver si DUPIXENT es adecuado para ti.
[CALLOUT] If you're a caregiver of a child (aged 6 months-11 years) or teen (aged 12-17 years) with eczema, work through these questions together and share the answers with their healthcare provider.	[CALLOUT] Si eres cuidador de un niño (de 6 meses a 11 años) o adolescente (de 12 a 17 años) con eczema, conversen juntos sobre estas preguntas y compartan las respuestas con su proveedor de atención médica.
[SECTION 1] **TOOLS TO TALK ABOUT YOUR SYMPTOMS** Eczema can be complicated, and that might make it hard for patients to get their loved ones and doctors to understand what it's like to live with it. Symptoms may be caused by many triggers, change over time, and look different on each person's skin tone. Overall, how much do your symptoms bother you? Consider sharing your response with your doctor. (Scale: 1=not at all bothersome, 10=extremely bothersome) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Not at all bothersome Extremely bothersome How does eczema affect your skin? [SPACE TO FILL-IN THE BLANK]	[SECTION 1] **HERRAMIENTAS PARA HABLAR SOBRE TUS SÍNTOMAS** El eczema puede ser complicado, y eso podría dificultar que los pacientes logren que sus seres queridos y médicos comprendan cómo es vivir con esta afección. Los síntomas podrían ser causados por muchos factores, pueden cambiar con el tiempo y tener un aspecto diferente en el tono de piel de cada persona. En general, ¿qué tan molestos son tus síntomas? Considera compartir tu respuesta con tu médico. (Escala: 1=nada molestos, 10=extremadamente molestos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nada molestos Extremadamente molestos ¿Cómo afecta el eczema a tu piel? [SPACE TO FILL-IN THE BLANK]
[CALL OUT BOX/ICON TBD] Eczema looks different on everyone. Tell your doctor if you have dry, itchy red patches that sometimes ooze and crack.	[CALL OUT BOX/ICON TBD] El eczema tiene un aspecto diferente en cada persona. Informa a tu médico si tienes partes rojas secas en la piel que te pican y que a veces supuran
[CALL OUT BOX/CAMERA ICON] Take photos of your skin during a flare-up and share	

them with your doctor to help them understand your symptoms.

[SECTION 2]
YOUR GOALS FOR TREATING YOUR ECZEMA
[COPY]
My hopes for my treatment are [SPACE TO FILL-IN THE BLANK]

[SECTION 3]
QUESTIONS TO ASK YOUR DOCTOR
DUPIXENT is a first-of-its-kind biologic treatment that can help proactively treat eczema symptoms from within. You can use these questions to ask your doctor if DUPIXENT is right for you or your child:

About DUPIXENT
- How can DUPIXENT help improve my itch and lesions?
- How does DUPIXENT work differently?
- What are the common side effects of DUPIXENT?

Dosing
- How is DUPIXENT taken?
- Where is DUPIXENT injected?
- How can I get injection training and support for DUPIXENT?

Support
- What support is available to help throughout treatment with DUPIXENT?
- How do I fill a prescription for DUPIXENT?
- Can I get more information about cost and financial assistance for DUPIXENT?

Note other topics you and your loved ones would like to discuss with your doctor: [SPACE TO FILL-IN THE BLANK]

[ICON TBD]
Have more questions? You can get free, one-on-one support in Spanish and English by calling the

y se agrietan.

[CALL OUT BOX/CAMERA ICON]
Toma fotos de tu piel durante un brote y compártelas con tu médico para ayudarle a comprender tus síntomas.

[SECTION 2]
TUS OBJETIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE TU ECZEMA
[COPY]
Mi esperanza para este tratamiento es [SPACE TO FILL-IN THE BLANK]

[SECTION 3]
PREGUNTAS PARA HACERLE A TU MÉDICO
DUPIXENT es el primer tratamiento biológico de su tipo que puede ayudar a tratar de manera proactiva los síntomas del eczema desde adentro. Puedes hacerle estas preguntas a tu médico para saber si DUPIXENT es adecuado para ti o para tu hijo/a:

Acerca de DUPIXENT
- ¿Cómo puede DUPIXENT ayudar a mejorar mi picazón y lesiones?
- ¿Cómo actúa DUPIXENT de forma diferente?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de DUPIXENT?

Dosificación
- ¿Cómo se administra DUPIXENT?
- ¿Dónde se inyecta DUPIXENT?
- ¿Cómo puedo capacitarme para dar las inyecciones de DUPIXENT y obtener apoyo para este proceso?

Apoyo
- ¿Qué tipo de apoyo está disponible para ayudarme durante mi tratamiento con DUPIXENT?
- ¿Cómo obtengo un suministro para mi receta para DUPIXENT?
- ¿Puedo obtener más información sobre el costo y la asistencia financiera para DUPIXENT?

Anota otros temas que tú y tus seres queridos

DUPIXENT MyWay® Case Managers at **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936).**

[AD INDICATION]

INDICATION

DUPIXENT is a prescription medicine used to treat adults and children 6 months of age and older with moderate-to-severe eczema (atopic dermatitis or AD) that is not well controlled with prescription therapies used on the skin (topical), or who cannot use topical therapies. DUPIXENT can be used with or without topical corticosteroids. It is not known if DUPIXENT is safe and effective in children with AD under 6 months of age.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not use if you are allergic to dupilumab or to any of the ingredients in DUPIXENT®.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont.)

Before using DUPIXENT, tell your healthcare provider about all your medical conditions, including if you:

- have eye problems.
- have a parasitic (helminth) infection.
- If you are scheduled to receive any vaccinations, you should not receive a "live vaccine" right before and during treatment with DUPIXENT.
- are pregnant or plan to become pregnant. It is not known whether DUPIXENT will harm your unborn baby.
    - A pregnancy registry for women who take DUPIXENT during pregnancy collects information about the health of you and your baby.
- are breastfeeding or plan to breastfeed. It is not known whether DUPIXENT passes into your breast milk.

Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements.

quisieran discutir con tu médico: [SPACE TO FILL-IN THE BLANK]

[ICON TBD]

¿Tienes más preguntas? Puedes obtener asistencia individualizada y gratuita en español e inglés llamando a los Administradores de Casos de *DUPIXENT MyWay*® al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936).**

[AD INDICATION]

INDICACIONES

DUPIXENT es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado a grave, que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas que se aplican sobre la piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan usar terapias tópicas. DUPIXENT puede utilizarse con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 meses que tienen DA.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE E INDICACIONES

No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®.

Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- Si tiene problemas oculares.
- Si tiene una infección parasitaria (helmintos).
- Si tiene programado recibir algún tipo de vacuna. No debe recibir ninguna "vacuna viva" antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.
- Si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT puede dañar al feto.
    - Un registro de embarazo para mujeres que toman DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre su salud y la del bebé.

Especially tell your healthcare provider if you are taking oral, topical, or inhaled corticosteroid medicines or if you have AD and asthma and use an asthma medicine. Do not change or stop your other medicines, including corticosteroid medicine or other asthma medicine, without talking to your healthcare provider. This may cause other symptoms that were controlled by those medicines to come back.

DUPIXENT can cause serious side effects, including:

- **Allergic reactions. DUPIXENT can cause allergic reactions, including skin reactions, that can sometimes be severe.** Stop using DUPIXENT and tell your healthcare provider or get emergency help right away if you get any of the following signs or symptoms: breathing problems or wheezing, swelling of the face, lips, mouth, tongue, or throat, fainting, dizziness, feeling lightheaded, fast pulse, fever, hives, skin rash, including rash that looks like a bullseye or painful red or blue bumps under the skin, general ill feeling, itching, swollen lymph nodes, nausea or vomiting, joint pain, or cramps in your stomach area.
- **Eye problems.** Tell your healthcare provider right away if you have any new or worsening eye problems, including eye pain or changes in vision, such as blurred vision. Your healthcare provider may send you to an ophthalmologist for an eye exam if needed.
- **Psoriasis.** This can happen in people with atopic dermatitis who receive DUPIXENT. Tell your healthcare provider about any new skin symptoms. Your healthcare provider may send you to a dermatologist for an examination if needed.
- **Joint aches and pain.** Some people who use DUPIXENT have had trouble walking or moving due to their joint symptoms, and in some cases needed to be hospitalized. Tell your healthcare provider about any new or worsening joint symptoms. Your healthcare provider may stop DUPIXENT if you develop joint symptoms.
- Si está amamantando o tiene planes de amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se trasmite a través de la leche materna.

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Sobre todo, infórmele a su proveedor de atención médica si está tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si tiene DA y asma y usa un medicamento para el asma. **No** cambie ni interrumpa la administración del corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar con su proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con esos medicamentos.

DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede provocar reacciones alérgicas, incluidas reacciones cutáneas, que algunas veces pueden ser fuertes.** Deje de usar DUPIXENT e infórmele a su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, hinchazón del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo sarpullido que parece una diana o protuberancias rojas o azules dolorosas debajo de la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.
- **Problemas oculares.** Dígale a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene nuevos problemas oculares o si nota un empeoramiento de los problemas que tenía, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un oftalmólogo para que le realicen un

The most common side effects in patients with eczema include injection site reactions; eye problems, including eye and eyelid inflammation, redness, swelling, itching, eye infection, dry eye, and blurred vision; cold sores in your mouth or on your lips; and high count of a certain white blood cell (eosinophilia).

Tell your healthcare provider if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of DUPIXENT. Call your doctor for medical advice about side effects. You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit www.fda.gov/medwatch, or call 1-800-FDA-1088.

Use DUPIXENT exactly as prescribed by your healthcare provider. It's an injection given under the skin (subcutaneous injection). Your healthcare provider will decide if you or your caregiver can inject DUPIXENT. **Do not** try to prepare and inject DUPIXENT until you or your caregiver have been trained by your healthcare provider. In children 12 years of age and older, it's recommended DUPIXENT be administered by or under supervision of an adult. In children 6 months to less than 12 years of age, DUPIXENT should be given by a caregiver.

examen, si es necesario.

- **Soriasis.** Esto puede ocurrir en personas con dermatitis atópica que reciben DUPIXENT. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en la piel. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un dermatólogo para que le realicen un examen, si es necesario.

- **Dolores en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenía. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrolla síntomas en las articulaciones.

Los efectos secundarios más comunes en pacientes con eczema incluyen reacciones en el lugar de la inyección; problemas oculares, que incluyen inflamación de los ojos y los párpados, enrojecimiento, hinchazón, picazón, infección ocular, ojo seco y visión borrosa; herpes en la boca o en los lábios; y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Le recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

Utilice DUPIXENT exactamente como se lo recetó su proveedor de atención médica. Es una inyección

	que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Su proveedor de atención médica decidirá si usted o su cuidador puede inyectar DUPIXENT. **No** intente preparar ni inyectar DUPIXENT hasta que su proveedor de atención médica le haya brindado capacitación a usted o su cuidador. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. En niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT.
[Page 3] **Please see additional Important Safety Information for DUPIXENT throughout.** **Please see accompanying full Prescribing Information including Patient Information.** [Sanofi logo] | [Regeneron logo]	[Page 3] **Por favor, consulte la Información de Seguridad Importante adicional sobre DUPIXENT de principio a fin.** **Por favor, consulte la Información completa de Prescripción adjunta, incluida la Información para el Paciente.** [Sanofi logo] | [Regeneron logo]
DUPIXENT and DUPIXENT MyWay are registered trademarks of Sanofi or an affiliate. © 2026 Sanofi and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. All Rights Reserved. US.DUP.26.05.0246 June 2026 [DUPIXENT logo]	DUPIXENT y DUPIXENT MyWay son marcas registradas de Sanofi o una filial. © 2026 Sanofi y Regeneron Pharmaceu ticals, Inc. Todos los derechos reservados. US.DUP.26.05.0246 Junio 2026 [DUPIXENT logo]

CERTIFICATION FOR TRANSLATION

June 15th, 2026

Job Code: US.DUP.26.05.0246

We Tag certify that to the best of our knowledge and belief, the translations in each column are true and faithful representations of each other in their respective languages.

Hannah Alexander

Project Manager – Language Services