



**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección 300mg

# DISFRUTA más CON MENOS EPOC

No es una paciente real.

**EL PRIMER TRATAMIENTO DE SU TIPO PARA LA EPOC  
(ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA)**

## INDICACIÓN:

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el tratamiento de mantenimiento de adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no controlada adecuadamente y con un número elevado de eosinófilos en sangre (un tipo de glóbulo blanco que puede contribuir a la EPOC). DUPIXENT se utiliza para reducir el número de brotes (empeoramiento de los síntomas de la EPOC durante varios días) y puede mejorar la respiración. **DUPIXENT no se utiliza** para aliviar problemas respiratorios repentinos y no sustituye a un medicamento inhalado de rescate. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 18 años con EPOC.

Consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente [en el bolsillo trasero].

# VIVIR CON EPOC

La causa de la EPOC es desconocida, pero sí conocemos algunos de los factores desencadenantes. La contaminación, el tabaco e incluso la genética pueden ser factores. Cuando tus síntomas empeoran más de lo habitual, es posible que estés teniendo un brote, que podría durar varios días. Podrías experimentar tos crónica, sibilancias, cansancio o tener problemas para respirar. Estos brotes podrían ser **leves**, **moderados** o muy **graves**.



Los **brotes leves** requieren el uso adicional de un inhalador de rescate




Los **brotes moderados** requieren el uso de esteroides orales y/o antibióticos, además de un inhalador de rescate



Los **brotes graves** requieren hospitalización o una visita a la sala de emergencias

Peor aún, cada brote puede acortar el tiempo hasta el siguiente brote. **La EPOC es una enfermedad crónica y progresiva que debe tratarse.**

## CÓMO LA INFLAMACIÓN AFECTA LAS VÍAS RESPIRATORIAS



Las investigaciones han demostrado que **los brotes pueden ser causados por un tipo de inflamación subyacente en las vías respiratorias de los pulmones**. Afortunadamente, es posible que haya algo que puedas hacer al respecto.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

**No utilices** este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®.

**Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluido lo siguiente:**

- si tienes problemas oculares.
- si tienes una infección parasitaria (helminto).
- si tienes programado recibir alguna vacuna.

No debes recibir una “vacuna viva” justo antes y durante el tratamiento con DUPIXENT.

**Consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente [en el bolsillo trasero].**

## EL PRIMER TRATAMIENTO DE SU TIPO

### DUPIXENT trata la EPOC de manera diferente.


Ayuda a bloquear una fuente clave de inflamación en los pulmones. Un análisis de sangre de rutina puede detectar si tienes este tipo de inflamación. DUPIXENT es un tratamiento complementario que se utiliza cuando otros medicamentos para la EPOC no son suficientes. No es un inmunosupresor, inhalador, esteroide ni antibiótico.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluido lo siguiente (cont.):


- si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
  - Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé.

Consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente [en el bolsillo trasero].

### ANTES DE DUPIXENT



### DESPUÉS DE DUPIXENT



Solo se pretende mostrar el mecanismo y no reflejar el efecto del tratamiento con DUPIXENT. La imagen es solo ilustrativa.

# respirar MEJOR ES POSIBLE

A las 52 semanas, en dos ensayos clínicos:

## SE DEMOSTRÓ QUE DUPIXENT PROPORCIONA UNA MEJORÍA DURADERA DE LA RESPIRACIÓN

Si tienes EPOC, quieres mejorar la función pulmonar y que esa mejoría sea duradera. DUPIXENT ayuda a las personas a respirar con más facilidad a partir de apenas dos semanas.

Eso es lo que hace posible **disfrutar más.**



No es un paciente real.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.):** Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluido lo siguiente (cont.):

- si estás amamantando o planeas amamantar.

Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

**Consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente [en el bolsillo trasero].**

**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección 300mg



No es un paciente real.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

(cont.): Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si estás usando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si tienes EPOC y también tienes asma. No cambies ni suspendas tus otros medicamentos, incluido el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma, sin hablar con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por esos medicamentos.

**DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas, incluidas reacciones en la piel, que algunas veces pueden ser graves.** Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si presentas alguno de los siguientes signos o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo erupción con aspecto de ojo de buey o dolorosas protuberancias rojas o azules bajo la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.

## CUANDO SE USÓ CON INHALADORES PARA LA EPOC,\* **DUPIXENT**<sup>®</sup> (dupilumab):



**Alivió los síntomas de la EPOC al ayudar a reducir los brotes**



**Condujo a una mejora en la vida diaria de los pacientes<sup>†</sup>**

**Los efectos secundarios más comunes en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluyen:** reacciones en el lugar de la inyección, síntomas del resfriado común (nasofaringitis), alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), infección viral, dolor de espalda, inflamación dentro de la nariz (rinitis), diarrea, gastritis, dolor en las articulaciones (artralgia), dolor dental, dolor de cabeza e infección del tracto urinario.

\*Los inhaladores para la EPOC se consideran un tratamiento estándar (SOC, por sus siglas en inglés), lo cual se refiere a un enfoque de tratamiento típico recetado por un profesional de atención médica para la EPOC.

<sup>†</sup>Evaluado mediante el SGRQ, una herramienta de calidad de vida que mide los síntomas de la EPOC, la actividad física, el bienestar emocional y el funcionamiento social. En dos ensayos clínicos, el 51% de los pacientes que recibieron DUPIXENT + SOC experimentaron una mejora en la calidad de vida, en comparación con el 43% y el 47% de los que recibieron placebo + SOC. En un ensayo, los resultados son descriptivos; no se pueden sacar conclusiones definitivas.

**Consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente [en el bolsillo trasero].**

**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección 300mg

CON DUPIXENT<sup>®</sup> (dupilumab)

disfrutar  
más ES POSIBLE

No es un paciente real.

# CÓMO SE ADMINISTRA DUPIXENT<sup>®</sup> (dupilumab)

**DUPIXENT es una inyección que se administra por vía subcutánea (debajo de la piel) una vez cada dos semanas.** Si un proveedor de atención médica decide que tú o un cuidador pueden administrar las inyecciones de DUPIXENT, ustedes deben recibir capacitación sobre la forma correcta de preparar e inyectar DUPIXENT.

PACIENTES	DOSIS RECOMENDADA	FRECUENCIA
18 años o más	300 mg	Cada 2 semanas

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.): DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes (cont.):

- **Problemas oculares.** Infórmale a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes problemas oculares nuevos o si notas un empeoramiento de los problemas que tenías, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Tu proveedor de atención médica puede referirte a un oftalmólogo para que te realicen un examen, si es necesario.
- **Molestias y dolor en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma en las articulaciones nuevo o que empeore. Tu proveedor de atención médica podría interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.



## PLUMA PRECARGADA

Esta pluma presenta un diseño que mantiene la aguja oculta durante su uso. Una ventana de visualización y un sonido de dos clics te permiten saber cuándo se ha completado la inyección.



## JERINGA PRECARGADA

Esta jeringa presenta un protector de aguja, así como un agarre contorneado para los dedos para proporcionar una sujeción firme mientras controlas la velocidad de la inyección.

## ¿TIENES PREGUNTAS SOBRE CÓMO SE INYECTA DUPIXENT?



Aprovecha nuestros **recursos complementarios para las inyecciones** y **videos de capacitación** escaneando el código QR.

**Consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente [en el bolsillo trasero].**

# ¿TU MÉDICO TE HA RECETADO DUPIXENT<sup>®</sup> (dupilumab)?

Tu proveedor de atención médica es siempre tu mejor recurso para obtener información sobre DUPIXENT y deberá ser tu principal punto de contacto a lo largo del recorrido de tu tratamiento.

## COMIENZA TU RECORRIDO.

Una vez que tu médico te haya recetado DUPIXENT, puedes registrarte en el programa DUPIXENT MyWay<sup>®</sup>.

- Para inscribirte, descarga el Formulario de Inscripción en <https://www.dupixent.com/copd/>
- Complétalo junto con tu médico, quien lo enviará por fax a DUPIXENT MyWay al 1-844-387-9370
- Llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936) y selecciona la **opción 2** para hablar con nuestros Administradores de Casos bilingües de DUPIXENT MyWay
- Si proporcionas tu dirección de correo electrónico, DUPIXENT MyWay puede brindarte más recursos de apoyo sobre DUPIXENT

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.):

**Los efectos secundarios más comunes en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluyen reacciones en el lugar de la inyección, síntomas del resfriado común (nasofaringitis), alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), infección viral, dolor de espalda, inflamación dentro de la nariz (rinitis), diarrea, problemas estomacales (gastritis), dolor en las articulaciones (artralgia), dolor dental, dolor de cabeza e infección del tracto urinario.**

**Consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente [en el bolsillo trasero].**

# ¿CÓMO PUEDE AYUDARTE DUPIXENT MyWay<sup>®</sup>?

DUPIXENT MyWay es un programa de apoyo al paciente diseñado para ayudarte a obtener acceso a DUPIXENT lo más rápido posible una vez que tengas tu receta. También te ayuda a seguir adelante con el tratamiento, ofreciéndote herramientas y recursos útiles.

Si eres elegible, DUPIXENT MyWay puede:



Ayudarte a investigar y entender los beneficios de tu seguro médico



Encontrar maneras de ayudarte con tus gastos de bolsillo para DUPIXENT si necesitas ayuda con el copago, si tu plan de salud te niega la cobertura, o si no tienes o has perdido tu seguro médico



Conectarte con un Administrador de Casos bilingüe que responderá a tus preguntas sobre DUPIXENT y te ayudará a comenzar y mantenerte al día con tu tratamiento



Conectarte con una farmacia especializada para que tu medicamento recetado se envíe a tu hogar o ubicación preferida



Explicarte cómo guardar DUPIXENT correctamente cuando recibas tu envío



Brindarte capacitación adicional sobre inyecciones, en persona, virtualmente o por teléfono, para ayudarte a ti o a un cuidador a familiarizarse más con el método de inyección de DUPIXENT



Ofrecerte un kit para desechar agujas para su correcta eliminación




Recordarte cuándo es el momento de renovar tu receta de DUPIXENT

## APOYO A TU MEDIDA

### TU COPAGO PODRÍA SER TAN BAJO COMO \$0\*

La tarjeta de copago **DUPIXENT MyWay**<sup>®</sup> podría ayudar a los pacientes elegibles a cubrir los gastos de bolsillo para **DUPIXENT**.



**EL 99%** DE LOS PACIENTES CON SEGURO MÉDICO COMERCIAL ESTÁN CUBIERTOS A NIVEL NACIONAL PARA DUPIXENT

Los pacientes elegibles con seguro médico comercial podrían **pagar tan solo \$0\* de copago** por suministro de **DUPIXENT**<sup>®</sup> (dupilumab). Se aplican términos y condiciones.

\*Sujeto al beneficio máximo del programa por paciente por año calendario. La aprobación no está garantizada. **NO ES UN SEGURO.** No es válido para recetas pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluidos los programas estatales de asistencia farmacéutica. Este programa no es válido donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o esté restringido. **DUPIXENT MyWay** se reserva el derecho de rescindir, revocar, terminar o enmendar esta oferta, elegibilidad y términos de uso en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier tipo de ahorro proporcionado por el programa puede variar según los costos de bolsillo de los pacientes. El programa tiene como fin ayudar a los pacientes a afrontar el costo de **DUPIXENT**. Los pacientes podrían tener planes de seguro que intentan diluir el impacto de la asistencia disponible bajo el programa. En esas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Se aplican términos y condiciones adicionales.

### PODRÍAS SER ELEGIBLE PARA OBTENER UNA TARJETA DE COPAGO:

- si tienes seguro médico comercial
- si te recetan **DUPIXENT** para una indicación aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)
- si eres residente de alguno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y eres un paciente o cuidador de 18 años de edad o más

### NO ERES ELEGIBLE:

- si tienes un seguro del gobierno, como Medicaid, Medicare, Asuntos de los Veteranos, Departamento de Defensa, TRICARE u otros programas federales o estatales

### OTRAS OPCIONES DE APOYO

A través del **Programa de Asistencia al Paciente**, los pacientes que no tienen seguro o que no están asegurados por su proveedor de seguros podrían recibir **DUPIXENT** sin cargo si cumplen con ciertos requisitos. Para cumplir con los requisitos, se deberá tener al menos 18 años de edad o más, ser residente de uno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y demostrar una necesidad financiera.

# más temas

## PARA HABLAR CON TU MÉDICO

Estas preguntas pueden ayudarte a guiarte sobre qué preguntar. Es importante que tu médico comprenda tus síntomas de la EPOC y los mecanismos para afrontarlos que podrías estar utilizando.

### ¿Alguno de los siguientes síntomas de la EPOC ha empeorado en los últimos 3 meses?

- Dificultad para respirar
- Tos crónica
- Flema persistente
- Sibilancias u opresión en el pecho
- Cansancio

### ¿Has hecho lo siguiente en el último año?

- Adaptar tareas o actividades para que resulten más fáciles
- Cancelar planes o evitar ciertas actividades
- Usar un inhalador de rescate
- Tomar esteroides o antibióticos
- Acudir al hospital o a la sala de emergencias

### ¿Cómo te afecta la EPOC?

- No me impide hacer las cosas que me gustaría hacer
- Me impide hacer algunas cosas que me gustaría hacer
- Me impide hacer muchas de las cosas que me gustaría hacer



No es una paciente real.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.):

Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llama al 1-800-FDA-1088.

Usa DUPIXENT exactamente como te lo recetó tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. **No** intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica.

**Consulta la Información Importante de Seguridad de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente [en el bolsillo trasero].**

**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección 300mg

¿QUÉ HARÁS CON  
LA POSIBILIDAD DE  
**disfrutar más?**

**PREGÚNTALE HOY**  
**A TU MÉDICO SOBRE DUPIXENT**



Escanea el código para visitar la página  
en inglés [DUPIXENT.com/COPD](https://DUPIXENT.com/COPD)

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

**No utilices** este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT<sup>®</sup>.

Consulta la **Información Importante de Seguridad de principio a fin** y la **Información de Prescripción completa** que se acompaña, incluida la **Información para el Paciente** [en el bolsillo trasero].

**sanofi** | **REGENERON**<sup>®</sup>

© 2026 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.

DUPIXENT y DUPIXENT MyWay son marcas registradas de Sanofi o de una empresa afiliada.  
US.DUP.26.03.0468 05/2026

La información de salud contenida en este folleto se proporciona únicamente con fines educativos en general. Tu médico es tu mejor fuente de información con respecto a tu salud. Por favor, consulta con tu médico si tienes alguna pregunta sobre tu salud o tratamiento.